



This is the Latin ed.
The German edition has a different
title: "Beiträge zur Besonderen Geschichte
der Vögel", Heft I, 1784 and Heft II, 1786

A V I V M
RARIORVM ET MINVS COGNITARVM
ICONES ET DESCRIPTIONES

COLLECTAE

ET E GERMANICIS LATINAЕ FACTAE

A

BLASIO MERREM,

PH. D. PHYS. ET MATH. IN REG. DVISBURGENSI ACAD. P. P. O.
SOC. R. SCIENT. GOTTING. LITTERAR. COMMERC. IVNCTO.

FASCICVLVS PRIMVS.

LIPSIAE,

EX BIBLIOPOLIO IO. GODOFR. MÜLLERIANO

clocclxvii.

271277



PARIS
LIBRAIRIE
DE
F. CHAMBERS,
12, RUE DES FOUGLES, 52
PARIS

Clark W. Richmond
Aug 7, 1920

BQL
761.2
M47
1786
BIRDGB

VIRO ILLVSTRISSIMO
DOMINO
CAROLO ABRAHAMO
LIBERO BARONI
DE ZEDLITZ,

DYNASTAE IN CAPSDORF, MICHELWITZ ETC.

BORVSSIAE REGIS
IN REBUS STATVS ET IVSTITIAE
AMICO
ACADEMIARVM REGIARVM
SVPREMO CVRATORI, TVTORI, SERVATORI

CVIVS INSIGNI HUMANITATI AC BENEVOLENTIAE MVNVS,
QVO FVNGOR, DEBEO.

GRATA ET PIA MENTE

D. D. D.

BLASIUS MERREM.


P R A E F A T I O.

Ex quo tempore primus Mantissæ huius germanice conscriptæ, fasciculus prodidit, variis impeditus obstatulis et curis, neque tam cito, quam optabam, secundum eius fasciculum edere, neque generalis avium historiae edendæ initium facere potui. Interea vero possessor bibliopolii Lipsiensis Mülleriani, libri vtriusque sumtus et curam in se fuscipiens, a me postulauit, vt simul cum textu germanico latinam conscriberem versionem, vt et ab exteris ornithologiae cultoribus legi et intelligi opus posset. Trado itaque Tibi L. B. primum huiusce versionis fasciculum, in omnibus textui germanico similem, nisi paucis in locis auctum atque emendatum, eodemque in posterum modo tam syllogen rariorum avium, quam generalem earum historiam, si non eodem, faltem non longo interiecto tempore, germanice latineque iuxta conscriptam accipies.

Monendum adhuc, ex avibus in hoc fasciculo descriptis vnam tantum (Graculam chrysopteram) Museo meo propriam, ideoque et accuratius descriptam et mensam fuisse, cum reliquarum in aliis collectionibus obuiarum, non nisi per vitrum quo erant inclusae depingendarum, describendarum, et metiendarum facultas daretur.

Non tamen est, cur dubitem, accuratam pro viribus descriptionem, et Eberleinii delineationem, errores, si qui hac de causa forte coorti, leuiores, ac nullius fere momenti reddidisse.

Cotin-



1. Rother Cotinga. *Cotinga rubra*. *Photinia cerasifera carminea*
2. Schillernder Cotinga. *Cotinga cuprea*. " " *miguelina* "?

C. E. Eberlein fec.



Cotinga rubra.*

Cotingae rubrae tres icones exstant, ante meam secundum naturam confectae, adeo autem inter se dissimiles, vt non nisi aegre eiusdem avis esse concedas. Maxime omnium a naturae similitudine SEBAE delineatio recedit, quae, an Cotingam nostram rubram exhibeat, merito dubito. Pafferis nempe magnitudinem non excedit, colore est obscure rubro, capite ex auro splendente, pedibus, rostroque coccineis; quare, licet concedam aureum illum capitinis splendorem vel

* Coyoltotl. FERNANDEZ *Histor. anim. Nov. Hispan.* pag. 44.

Auicula de Pipitzon dicta? SEBA *Thes. I.* pag. 92 tab. 57 fig. 4.

Fringillae adfinis? MOEHRING *Gen. av.* pag. 79.

Een Vogel die naast aan den Fink komt. MOEH-
RING *Geslagten der Vogelen* pag. 70.

The Red Bird from Surinam. EDWARDS *Birds I.* pag. 39 tab. 39.

Der surinamische Rothvogel. Garrulus ruber suri-
namensis. SELIGM. *Voeg. I.* tab. 77 (fig. Edw.)

Turdus totus ruber. Icterus surinamensis ruber
KLEIN *hist. av.* pag. 68.

Rother Wittewall. Icterus ruber. KLEIN *hist. der Vögel* pag. 67.

Die rothe surinamische Drossel. HALLE *Nat. Gesch. II.* pag. 293.

Cotinga anterius sordide rubra; posterius coccinea, vertice coccineo, remigibus obscure rubris, ad apicem subnigris, rectricibus coccineis apice nigris. Cotinga rubra. — le Cotinga rouge. BRISSON *Orn. II.* pag. 351.

Lanius (Carnifex) ruber, fascia oculari, remigum, rectricumque apicibus nigris. LINN. *Syst. nat. edit. 10. I.* pag. 94.

Merrem *av. ic. I.*

Beul. HOUTTUYN *Nat. Hist. I. Deel. 4. St. p. 219.*

Ampelis (Carnifex) ruber, fascia oculari, remigum rectricum apicibus nigris. LINN. *System. nat. edit. 12. I.* pag. 298.

Der Mörder. MÜLLERS LINN. *Nat. Syst. II.* pag. 542.

Velia rossa del Surinam. Lanius ruber surinamensis. La Pie-griesche rouge de Surinam. *Recueil de 130 Ois. tab. 83.* (fig. Edwardi.)

Velia rossa del Surinam. Lanius ruber Surinamensis GERINI *Orn. I.* pag. 74 tab. 58 fig. 2. (fig. Edwardi.)

Cotinga rossa. Cotinga rubra Briss. GERINI *Orn. III.* pag. 57.

Cotinga rouge de Cayenne DAUBENTON *Pl. ent. No. 378.*

L'ouette ou Cotinga rouge de Cayenne BUFFON *hist. nat. des Ois. IV.* pag. 452.

Ampelis Carnifex L. Cotinga rubra Br. der rothe Seidenschwanz. BOROWSKY *Nat. Gesch. III.* pag. 173.

In Guyana lingua gariponna Arara vel Apira; lingua creolica Vette; lingua gallica Cardinal (secundum Buffon) in Mexico Coyoltotl (secundum Fernandez.)

A

vel varietatem nullius momenti, vel ex pictoris describentisve phantasia additum esse, pedum vero rostrique colores mire variare in hac specie, ut re vera variare videntur, (quippe in iconē Edwardina rostrum obscure rubrum est, pedes aurantii coloris; in Daubentoniana illud fuscum, hi rosei, cum in eo, quo ego usus sum, exemplari, et illud, et hi fusci essent,) magnitudine tamen figura illa a nostra nimis discrepat, quam ut Briffonio et Buffonio facile assentire, eamque Cotingae rubrae iconem putare possim. Hoc certe constat, SEBAM nostram, si exhibuerit auem, horrotinam descripsisse: at vero, quomodo illam cum avicula, a FERNANDEZ *Pipitzon** appellata, comparare potuerit, plane non video, quippe, quam Coltotl, auiculae superne nigrae, inferne cinereae,** adeo similem esse, refert Fernandez, ut vix alteram ab altera discernere atque separare possis, quae itaque tam a vera Cotinga rubra, quam ab avi a SEBA delineata, si forsan alia est, magnopere differt.

Aliam autem *Coyoltotol* nomine auem FERNANDEZ describit, *** huic nostrae, ut videtur, simillimam. „Avis est mediocris magnitudinis, inquit, fuscis pedibus, cruribusque, „rostro crassissimo, fuso et brevi, ac definente in acumen, pectore ac ventre coccineis, ac „reliquo corpore subrubro atque nigrescente, nomen habet a sonitu illi sonalium simili.“ Quod ultimo hic loco narrat, parum quidem cum auctoritate Ill. Comitis A BUFFON congruit, vocem Cotingae rubrae sono *Vette* assimilantis; sed nihil certe quicquam magis dubium, magisque vacillans inuenitur, quam inarticulatus animalis cuiusdam sonus per literas expressus, praesertim si, quod hic factum est, in denominationem trahitur. Ipse plurimis experimentis deprehendi, in voce animantis alicuius literis imitanda, mihi subinde, quamuis non mutato aurium iudicio, tamen alia atque alia literarum elementa placuisse. In nominibus autem inde fitis, discrepantia illa multo adhuc notabilior est; quis enim hominum facile putabit, diuersa haecce nomina Pyrold, Wiedewall, Bülow et Oriolus, eidem avi a fono, quem edit, indita esse, imo priora tria ab yna eademque gente.

In decima systematis sui editione Cotingam nostram Laniorum generi inserebat LINNAEUS, satis ille quidem excusandus, quippe deceptus vitiosa EDWARDI iconē, falsaque rostri delineatione, ex cuius traditione avi rostrum est illi Piprarum simile, sicuti et ipsam auem

* Auicula est, Coltotl vocatae adeo similis, ut vix alteram ab altera discernere atque separare possis, eademque fere natura, quam ob rem plura de ea dicere supersedeo. FERNANDEZ *Hist. anim. Nov. Hyp. pag. 73.*

** Auicula est Coltotl, passeris nostratis magnitudine et forma: plumis inferne cinereis, superne nigris, sed per ambitum interdum nigris, interdum cinereis IDEM l. c. pag. 18.
*** l. c. pag. 44.

auem ad harum genus referre non dubitat. In hac vero Edwardi tabula non rostri modo figura a naturae aemulatione longe recedit, imo aliae quoque, caudaque male depictae sunt; aut maxime peccatum est, in pennis delineandis, quod quidem in plurimis avium iconibus accidere solet, quod ea cura pictorum arbitrio plerumque relinquitur, qui pennarum formas plane negligentes partim nullas omnino pingunt, partim promiscue omnes simili modo reddunt, partim ad instar squamarum vel tegularum eas componunt et instruunt.

Cotinga rubra in multis *Indiae occidentalis* partibus habitat. Et Edwardi Exemplar et meum a *Surinamo* advectum erat, Buffonii e *Guyana*, Fernandezii autem *Coyoltotoli* Mexicanae erat originis. Hanc nostram Cotingam aequa ac Pompadoram per varias Guyanae regiones migrare Ill. BUFFON refert, rubram autem in interioribus huius terrae tractibus hac multo esse frequentiorem.

Pennae, quae verticem obtengunt, mira sua conformatioe solae sufficient ad auem nostram a caeteris sui generis speciebus dignoscendam. Has in cristae formiam exigere eam posse EDWARDUS coniicit; mihi vero, ut idem credam, nec pennarum istarum breuitas permittit, nec forma, nimis diuersa a pennis his, quae in aliis avibus formandis cristis inferunt; quae cauſa sola satis me auocare posset a conjectura ea amplectenda, etiamsi non et hoc accederet, quod pennis hisce vertex totus ad supercilia vsque vestiatur. In splendido illo, sed ob innumera errata vicia, et fictas certe faepius, vel ad descriptiones confectas pessimasque plerumque icones inutili fere opere GERINTIANO, huic conjecturae, quae pro re explorata venditatur, nescio, quo auctore additum video, pennis occipitis nigricantes, basi vero et subtus luteas esse *; quae assertio falsissima certe et a natura longe aliena est. —

Nec hoc tacendum, Ill. Comitem A BUFFON et EDWARDUM perhibere, posticas pedum partes ad exortum vsque digitorum plumulis esse obduelas, quae quidem in eo exemplari deficiebant, vnde mea et descriptio et delineatio petita est, et cuius spectandi copia mihi facta est, in egregio avium euisceratarum et aliena farcta repletarum apparatu, quem rerum naturalium vendor Anglicanus aliquis, nomine Dolmer, aestate a. MDCCCLXXXIII Gottingam veniens, circumferebat. Facile tamen crediderim, concinnatorem, falsa elegantiae specie ductum, pedes nudasse plumulis innatis.

DESCRIT.

* Penas in occipite ad nigrum tendentes colorem aliquando erigit, quae subtus et in exortu lutescente donantur colore. GERINI l. c. I. pag. 74.

COTINGA RUBRA.

DESCRIPPIO
COTINGAE RUBRAE.

Tab. I. Fig. I.

Magnitudo Merulae, corporis habitus aliquanto gracilior, quam caeterarum huius generis specierum.

Rostrum castaneum, breve, emarginatum, subconvexum, mandibula inferiore plana. Nares ouales, apertae, in basi rostri.

Caput magis conuexum, quam in caeteris vertice depresso praeditis, pennis, acuminate, paruis, duriusculis, densisque vestitum. *Oculus* pone oris angulum. *Aures* pennis longissimis obtectae.

Corpus vestiunt pennae longae, molles, acuminatae; in primis vero eae, quibus inferior corporis pars induitur, longissimae sunt, radiis raris praeditae.

Alae ultra vropygium protenduntur.

Crura tenuia pennis brevibus vestita. *Pedes* mediocres antice scutati. *Digitus medius* longissimus, *laterales* multo breviores, posticus brevissimus, sed vngue longissimo praeditus. *Digitus exterior* cum medio ad vsque medietatem phalangis primae cohaerens. *Vngues* mediocres, acuti, subincutui, nigri. *Pedes*, digitique fusci.

Cauda mediocris aequalis rectricibus duodecim aequalibus.

Color pennarum. Totum corpus inferius vropygium et pileus sanguinea, rectrices sanguineae, apice nigricantes. Genae, collum, dorsumque obscure fusca. Guttur fusco purpureum. Supercilia nigra. Remiges primariae cum rectricibus suis et ala notha nigrae, secundariae cum rectricibus castaneae: Rectrices alae minores fulvae, margine fuscae.

MENSURA E.

| | | | |
|---|----|----|-----|
| Longitudo totius avis usque ad apicem caudae | 8" | 6" | 0"" |
| Longitudo rostri usque ad frontem | 0, | 5, | 3 |
| Longitudo caudae | 3, | 0, | 0 |
| Longitudo pedis | 1, | 0, | 0 |
| Longitudo digiti medii cum vngue (vnguis 2" 0"") | 0, | 9, | 0 |

Cotin-



Cotinga cuprea.

Nouam hanc, nec ante me ab ullo historiae naturalis scriptore memoratam, Cotingae speciem pariter ac rubram in nitido, multisque rarioribus auium speciebus referto thesauro Dolmeriano inueni, in quem ex *Surinamo* allata erat. Primo auis huius aspe^ctu mox adeo ad praecedentis similitudinem, magnitudine, coloribus, forma, totoque corporis habitu accedentem animadvertes, vt facile eam vel eiusdem speciei varietatem, vel sexu tantum diuersam credere potueris. Quo quidem ipse errore deceptus, in programmate figurae speciminis loco aeri incisae, addito, hanc illius fine dubio feminam esse, demonstrare tentaui. Sed, non obstante tam conspicua vtriusque auis similitudine patriaque communi, diuersam fane a praecedente speciem fatis superque arguunt pennarum verticalium forma, oculorum situs, alae longiores, caudaque rotundata; ita vt fine vlla haesitatione speciem hanc nouam, et a congeneribus plane diuersam praedicare audeam.

DESCRIPTIO COTINGAE CUPREA

Tab. I. Fig. 2.

Magnitudo praecedentis, *habitus* congenerum.

Rostri forma ac color vt in rubra.

Caput mediocre, depresso. Genae pennis crispis, aures longissimis et amplis obtectae. *Caput* et collum vestiunt pennae minores, densiores, durioresque, quam reliquae.

Corpus, vt in omnibus huius generis, graue, informe, pectore prominente. Pennae dorsales longitudine mediocres, durae, radiis rudibus praeditae, ea vero, quibus corpus inferius indutum est, longissimae, molles, et raris amplisque radiis instructae sunt.

Alae paullum vltra quartam longitudinis caudae partem extenduntur.

Cauda rotundata, rectricibus duodecim rotundis duriusculis.

A 3

Pedes

COTINGA CUPREA.

Pedes breues, scutis tecti, fuscis. *Digitus* medius longitudine pedis, *laterales* et *posticus* paullo breuiores. *Vngues* nigri.

Color pennarum. Pileus ruber, genae aurantiae, collum et dorsum olivacea, pennarum apicibus colore aurantio vel cupri quodam splendore instructis: Pecltus et venter sanguinei, cauda sanguinea, rectricum marginibus pro varia ad lucem conuersione viridem colorem referentibus, et ipso sanguineo colore rubrum reflectente.

M E N S U R A E

| | | | |
|-----------------------------------|----|-----|-----|
| Longitudo totius avis | 8" | 6" | 0"" |
| Longitudo rostri vsque ad frontem | 0, | .5, | 5 |
| Ab oris angulo ad angulum oculi | 0, | .4, | 0 |
| Longitudo caudae | 2, | 10, | 0 |
| Longitudo pedis | 1, | 0, | 0 |
| Digitus medius (vnguis 2" 0'') | 0, | 10, | 0 |

Gracu-



Gracula nobilis · Edle Atzel



Gracula nobilis.

Auis, ad cuius historiam ac descriptionem parandam me accingo, Graculae longirostrae ab III. PALLAS descriptae * adeo adfinis, forma, partium proportione, omnibusque characteribus diagnosticis adeo similis est, vt nullum cuiquam dubium oriri posse existimem, ambas ad unum idemque genus pertinere. Differt quidem longirostra illa vibrissis in oris angulo sitis a nostra, cui deficiunt; discriminem autem hocce non tanti momenti mihi videtur, vt inde iusta alterutram ab altera separandi caufsa petenda sit, nec illud ad genera discernenda sufficeret puto, quippe vibrissarum harum usus adhuc ignoratur, neque illae in vitae genere, viatu, moribusque auium immutandis quicquam valere credibile est, quare mihi non nisi pro characteribus specificis adhibendae esse videntur.

PALLAS longirostram suam Graculam *Graculis* illis innumerat, quibus *caluae religiosae*-que nomen LINNAEUS imposuit, et quae ab aliis *minores* appellantur, a quibus tamen corporis habitu, rostri forma, partiumque structura et proportione aperte fatis differunt; ne dicam, genus hocce ab Illustr. Equite conditum ad ea pertinere systematis sui genera, quae maxime a natura aliena videantur; quippe quod ex speciebus constet, in characteribus nequidem artificialibus similibus, multoque minus in maioris momenti proprietatibus, moribus, nutritione, structura corporis conuenientibus.

Si autem longirostram illam, nobilemque nostram Graculam cum aliorum generum auibus comparamus, apparet, illas, vt PALLAS iamiam obseruauit, multis modis ad *Certhias* *Meropes*que accedere; ulterius autem examinanti plures, quibus ab illis distinguuntur, differentiae non latebunt: Non idem si cum illis contuleris, quas BRISSONIUS *Icteros*, PALLAS autem *Xanthornos* appellat: Rostri formam eandem, eandem narum, magna squama obtectarum, et a fronte remotarum figuram, linguam pariter profunde bifidam, pedes robustos scutis parte antica obtectos, quae tamen in exterioribus pedum partibus euancescunt, vnguem posticum fortem magnumque, caudam longam, eandem alarum proportionem, tantam denique partium exteriorum omnium similitudinem deprehendes, unde non fine caufsa colligas, similem etiam esse partium internarum structuram, simile vitae genus, mores infitos similes, pastum item similem. Haec tamen comparatio non est instituenda ad ductum notarum genericarum a Cl. PALLAS aiiisque systematum conditoribus editorum, sed natura ipsa in subsidium vocanda, quando quidem

haud

* *Spicil. zool. Fas. VII. pag. 5.*

haud pauci characteres specifici pro genericis venditantur, praesertim corneus ille angulus, a rostro in frontem excurrens, reuera in duabus tantum tribus speciebus obuius.

Cum hocce genus e variis Graculae LINNAEI et Orioli speciebus conflet, quibus singulis neque *Xanthorni* Iberique nomen, neque germanicum *Gelbvogel*, quo Cl. PALLAS usus est, conuenit, *Graculae* illi nomen imposui, Linneanum genus in bina genera diuidens, quorum alteri *Minois* appellationem melius conuenire credo. Ad quod Graculae genus, quamvis nobilis nostra et longirostra PALLASII pertineant, nihilominus ambae a congeneribus discernuntur, rostro pedibusque longioribus et statura graciliore, qua de caufa separatae familiae loco habere eas non incongruum videtur.

Gracula nobilis, quae primum ex nouissimo circa orbem terrarum itinere, Cookii funere insigni, innotuit, et in Europam aduecta est, patriam agnoscit *insulas sandwicenses*. Exemplar eius vna cum copioso et eximio rerum arte faclarum ex noua Seelandia allatarum apparatu Regis Magnae Britanniae munificentia museo Gottingensi proprium esse voluit. Pennas eius imprimis paucas illas flauas subaxillares harum insularum incolae tam vestimentis, quam cassis-dibus illis adornandis adhibent, quibus idolorum fuorum capita integunt: Quae capitum insignia e pennis Mellisugae coccinea confecta, ut augustiori specie oculos feriant, pennis illis flauis simbi aurei loco adornantur. Caeterum ex parua exuuiarum graculae nobilis copia in Europam hucusque translatarum, earum autem multitudine, quae de Mellisuga coccinea obuiae sunt, de maiori minoriue vtriusque auis frequentia existimanti, facile verisimile fieri possit, illarum aliquanto minorem, quam harum numerum in illis insulis inueniri, cui cum paucitas flauarum pennarum accedat, in singula aue obuiarum, merito hasce in maiori pretio apud insulanos istos esse, quam rubras, aestimandum est.

D E S C R I P T I O G R A C U L A E N O B I L I S.

Tabula secunda.

Moles Sturni.

Rostrum capite longius, conico elongatum, acuminatum, vtrinque carinatum, subincisum, nigrum. *Nares* peruviae (nisi hoc forte vitium sit exemplaris, quod ante oculos habeo) a fronte remotiusculae, squama ad frontem excurrente, et naribus formam lunatam praebente obiectae.

Caput

Caput paruum. Superne pennis paruis, duriusculis, acuminatis, squamaeformibus, subtus pennis in apice criniformibus vestitum. *Oculi* magni, medii.

Collum longum. *Corpus* gracile. Pennae flavae subaxillares et hypochondriacae longae, criniformes, quod propinquam cum Paradiseis cognationem indicare videtur.

Alae mediocres ad medianam caudam procurrentes.

Crura brevia. *Pedes* multo longiores, quam in caeteris huius generis avibus, scutati, nigri. *Digiti* longi, *posticus* fere eadem, qua medius, longitudine; *laterales* vero multo breviores. *Vngues* magni, acuminati, *posticus* longissimus.

Cauda longa, sed in eo exemplari, cuius describendi copia mihi facta est, septem tantum rectricibus constabat, et omnino haud obscura damni illati praebet indicia. Decem ad minimum rectricibus eam instructam fuisse apparebat, vix autem dubito, quin duodecim continuerit, licet duas pennas illas, quae ab utroque latere excidisse verisimile est, caeterarum numero addere ausus non fuerim. Earum, quae aderant, intermediae rotundatae erant, exteriae acuminatae, nec facile distinguendus harum ad illas transitus. Cauda cuneata, adeo ut rectrices exteriae ad dimidiad tantum mediarum longitudinem porrigantur.

Color pennarum ater exceptis pennis quibusdam subaxillaribus et crisco flavis. Rectrices 1, 1 et 2, 2, albae in basi interius nigrae, exterius flavae, scapo nigro, et in apice linea nigrae praeditae.

M E N S U R A E

| | | | | | |
|---|---|---|-----|------|------|
| Longitudo ab apice rostrum ad caudam extremam | - | - | 8'' | 0''' | 0''' |
| Longitudo rostrum ad frontem | - | - | 1, | 1, | 5 |
| Longitudo eiusdem ad oris angulum | - | - | 1, | 2, | 0 |
| Longitudo caudae | - | - | 3, | ii, | 0 |
| Longitudo pedis | - | - | 1, | 4, | 5 |
| Longitudo digiti medii (vnguis 3''' 2'') | - | - | 0, | 9, | 5 |
| Longitudo digiti interni (vnguis 3, 4) | - | - | 0, | 8, | 0 |
| Longitudo digiti externi (vnguis 3, 1) | - | - | 0, | 9, | 0 |
| Longitudo digiti postici (vnguis 4, 0) | - | - | 0, | 9, | 2 |



+ Gracula chryoptera.

Graculae breuirostres multis, vt videtur, modis pro diuersa colorum distributione variant, vnde Cl. BRISSON, quem saepe colorum ductus, leuiter variantes, ad nouas species introducendas adducere solebant, numerum earum, meo quidem iudicio, citra necessitatem, nimio plus auxit; ideoque, cum saepius in eundem incidat errorem, in historia avium multarum confusionum auctor est LINNAEUS minus seuerus in constituendis animantium, quam planitarum speciebus, Brissone vestigia, plerumque fine vltiori in aues ipsas instituta disquisitione, pressit. In contrariam autem partem haud raro peccat III. Comes A BUFFON, animalia notis multum diuersis distincta ad vnam eandemque speciem reuocans: cuius rei exemplum extat in *Gracula chryoptera*, quam, nescio, qua caufsa commotus, feminam esse statuit *Graculae Xanthorni* (Orioli Xanthorni Linn.) *, cum tamen ambae non tantum coloribus, sed etiam partium dimensionibus ac proportione, et ipsa magnitudine aperte satis a se inuicem distinguantur. Nimirum *Graculae Xanthorno* alae multo sunt breuiores, et rostrum breuius, pedes vero pro corporis mole longiores, quam *chryopterae*, quae omnia differentiam quamdam specificam aperte satis arguunt.

Melioribus et certioribus rationibus nifus III. BUFFON varietates huius, falso creditae, feminae recensuit, qua quidem in re non possum, quin plane illi assentior, cum eae omnes magnitudine, forma, partiumque proportione ne tantillum quidem distent, licet color non omnibus omnino sit idem.

+ Primae varietatis est *Gracula chryoptera chrysocephala* ** cuius iconem in tabula tercia exhibendam curaui, eo quod in delineatione Brissonica, qua sola hucusque erat vtendum, colores desiderantur. Solo capitinis colore luteo haec a caeteris differt, vnde marem coniicio.

Secundam

* Vtranque coniunxit nomine le petit Cul-jaune de Cayenne. *Hist. nat. des Ois.* III. pag. 247 der kleine kayennische gelbe Carouge. *Leipz. Uebers.* XI. Band 1. pag. 181. *Berl. Uebers.* VIII. p. 158.

** Icterus splendide niger, capite superiore, te-
etricibus alatum, et caudae minoribus, infimis-
que cruribus luteis, remigibus rectricibusque
nigricantibus. *Xanthornus icterocephalus* amer-
icanus — Le Carouge à tête jaune d'Amerique.
BRISSON *Orn. suppl.* pag. 30 tab. 2 fig. 2.

Oriolus (chrysocephalus) niger, pileo teetricibus
alarum caudaeque luteis. LINN. *Nat. Syst.*
edit. 12. I. pag. 164.

Amerikanische Golddrossel. MÜLLERS LINN.
Nat. System. II. pag. 191.

BUFFON *histoir. natur. des Ois.* III. pag. 248.
Berl. Uebers. VIII. p. 153. — *Leipz. Uebers.*
XI. 1. Band pag. 182.

Xanthornus icterocephalus americanus Briss. die
gelbköpfige Drossel aus Amerika. *Onomat. h. n.*
compl. VII. pag. 863.



Gracula chrysoptera. Gelbschultrige Atzel.

Secundam varietatem constituit *Gracula chrysoptera Dominicensis*,* ea ipsa, quam Graculae Xanthorni feminam esse Buffonius putat, nec nisi capite similiter ac reliquum corpus nigro, ventre autem fere toto luteo a priori diuersa.

Varietas denique tertia, *Gracula chrysoptera Cayanensis*,** cui, vt Dominicensi, caput est nigrum, ab vtraque differt vropygio nigro, teetricibus vero alarum secundi ordinis luteis. In iconē Edwardina maxilla superior prope basin est depresso, quod mihi tamen indicio esse videtur, exemplar, quo ille vsus est, damni aliquid paſſum esse.

Varietates hae omnes, haſtēnus recensitae, in diuersis *Americae australis* partibus nascuntur, tertia autem BRISSONIO et patre FEUILLÉE auctōribus etiam *St. Thomae* insulam incolit.

BUFFONIUS de vita genere ac moribus auiculae, quam *Cul-Jaune de Cayenne* vocat, et quo nomine tam Graculam Xanthornum, quam chrysopteram comprehendit, haec refert:*** „Ils ont un jargon à peu près semblable à celui de notre l'oriot, et pénétrant „comme celui de la pie. Ils suspendent leurs nids en forme des bourses à l'extrémité des „petites branches, comme les troupias; mais on m'affirme que c'est aux branches „longues et dépourvues de rameaux des arbres, qui ont la tête malfaite, et qui sont „penchés sur une rivière: on ajoute que dans chacun de ces nids il y a de petites séparations „ou

* Icterus niger; teetricibus alarum minoribus, et imo corpore luteis. Xanthornus dominicensis — Le carouge de St. Domingue. BRISS. *Orn. II.* pag. 121 tab. 12 fig. 3.

Oriolus (dominicensis) niger, corpore postico teetricibus alarum, maculaque luteis. LINN. *Syl. nat. edit. 12. I.* pag. 163.

Domingo Drossel. MÜLLERS *Linn. Nat. Syſt. II.* pag. 190. Le carouge de St. Domingue DAUB. *Pl. ent. No. 5 fig. 2.*

BUFFON *hist. nat. des Oif. III.* pag. 247 — Berl. *Ueberf. VIII.* p. 158 (cum fig. Daubentoniana) — Leipz. *Ueberf. XI. Band I.* p. 181.

Xanthornus dominicensis Briff. Die Amsel von St. Domingo. *Onomat. h. n. compl. IV.* p. 517. *Galli in dominicensi insula testē Briffonio Demoiselle vocant.*

** Autre espece de Merle beaucoup plus petite. FEUILLÉE *Journ. des observ.* 1725 p. 126.

The Yellow-Winged Pye. EDWARD *Glean. III.* pag. 239 tab. 322.

Die Aelster mit gelben Flügeln. SELIGM. *aust. Voegel V.* tab. 12 (fig. Edwardi.)

Icterus niger, teetricibus alarum minoribus luteis Xanthornus Cayanensis — Le carouge de Cayenne BRISS. *Orn. II.* pag. 123 tab. 9 fig. 2.

Oriolus (Cayanensis) niger, macula alarum lutea LINN. *Syl. nat. edit. 12 I.* pag. 163.

Gelbflügel. MÜLLERS *Linn. Nat. Syſt. II.* p. 190. Carouge de Cayenne DAUB. *Pl. ent. No. 535 fig. 2.*

BUFFON *hist. natur. des Oif. III.* pag. 248. — Berl. *Ueberf. VIII.* pag. 156 (cum fig. Daubent. — Leipz. *Ueberf. XI. Band I.* pag. 182. Xanthornus cayanensis Briff. Die Amsel von St. Thomas. *Onomat. h. n. Compl. IV.* pag. 517.

*** BUFFON *l. c.* pag. 247.

„où sont autant de nichées, ce qui n'a point été observé dans les nids des troupiales.“ Quae BUFFONII verba cum generaliter dicta sint, in ambiguo relinquuntur, descriptarum modo specierum vtra sit, de qua ille haec acceperit. Quia autem ex ambarum figura et habitu, perquam simili, colligere par est, nec ingenio, nec moribus eas inter se admodum differre, videntur mihi ea, quae hic a Buffonio relata sunt, certe maxima ex parte in vtramque quadrare.

Denique et hoc monendum; varietatis dominicensis et cayanensis icones, tam Dau-bentonianas, quam Briffonianas ad eadem exemplaria Martineti opera et delineatas, et aeri inci-fas cum Briffonii descriptionibus ac dimensionibus in primis ad caudam, quod attinet, parum congruere, ita vt in his nulla certa insit au^toritas. Figura vero varietatis chrysocephalae, quam solus Briffonius exhibuit, fatis est accurata. —

D E S C R I P T I O
V A R I E T A T I S C H R Y S O C E P H A L A E,
G R A C U L A E C H R Y S O P T E R A E.

Tabula tertia.

Magnitudo Alaudae, statura Sturni.

Roftrum longitudine capitis, conico elongatum, acutum, integrum, nigrum. *Nares* in basi eius, squama tectae.

Caput mediocre, *oculi* medii, *aures* pennis longis tectae.

Alarum remiges sedecim, quarum octo primores, totidemque secundariae, omnes rotundatae. Secundae, quae est omnium longissima, apex medianam caudam attingit.

Crura brevia. *Pedes* breues, interno tantum latere scutati. *Digiti* mediocres, quorum exterior cum medio ad dimidiā usque primae phalangis longitudinem coniunctus est. *Medius* longissimus est. *Laterales* multo breuiores. *Poſticus* minimus, sed yngue longissimo praeditus.

Vngues

Vngues fortes, incurvi. Pedes, digiti et vngues fusco-nigricantes. Cauda perlonga, cuneata. Rectrices duodecim subacuminatae.

Color pennarum ater. Remiges rectricesque ex atro-fuscae. Vertex, occiput, vropygium, crissum et crura lutea, rectrices alarum inferiores sulphureae.

M E N S U R A E.

| | | 4" | 4"" | 0"" |
|---|----------|-----|-----|-----|
| Longitudo ab apice rostri ad vropygium | - | 4" | 4"" | 0"" |
| Longitudo ad caudam extremam | - | 8, | 3, | 0 |
| Longitudo rostri ad frontem | - | 0, | 9, | 3 |
| Longitudo rostri ad oris angulum | - | 0, | 11, | 0 |
| Longitudo pedis | - | 0, | 11, | 0 |
| Longitudo digiti medii (vnguis | 3"" 1"") | 0, | 11, | 2 |
| Longitudo digitorum lateralium (vnguis | 2, 7) | 0, | 6, | 6 |
| Longitudo digiti postici (vnguis | 4, 0) | 0, | 10, | 1 |
| Longit. caudae ad apicem rectricum (6, 6) | - | 3, | 9, | 0 |
| Longit. eiusd. ad apicem rectricum (1, 1) | - | 2, | 8, | 4 |
| Interstitium apicum alarum extensarum | - | II, | I, | 0 |



+ *Mellifuga coccinea.**

Genuit hanc Mellisugae speciem insula *O-Waihi*, caede longe clarissimi circa orbem navigatoris famosa, ibique frequentissime inuenitur, cuius laqueis captae, pennis, pulcerrimo rubore insignibus, insulani ad vestimenta ornanda, ad cassides, pallia, caet. confienda vtuntur.** Magnam harum auium copiam in Europam translatam esse inde appareat, quod **F O R S T E R U S iunior**, qui primam earum edidit descriptionem, quatuor ante oculos habuit, meam autem tria exemplaria adiuerunt, quorum vnum, cum insigni ex pennis huius auis coccineis affabre confectionarum rerum apparatu Goettingae in Museo rerum naturalium regio affruatur, in quod nomine *Red Humming-Bird* missum est, caetera duo in collectione Dolmeri saepius nominati prostabant. Pennas harum auium Tahitinae reliquarumque socialium insularum incolae pretiosissimis rebus adnumerant, tantique faciunt, vt vel vnicae earum pretium statuant integræ suis.

Cl. **F O R S T E R U S** rostri huius auis formam, quippe quod margine superiore non carinatum sit, sed conuexum, quandam cum Paradisiis similitudinem indicare putat, quae tamen assimilatio longius mihi repetita videtur, quandoquidem vere affirmare possim, me conuexam hanc rostri superiore paginam in pluribus, imo plerisque huius generis auibus, quas videre licuit, deprehendisse. Reftius vero ab illis sui generis dignoscitur pedibus proportione longioribus, quorum mira breuitate caeterae Mellisugae omnes ad similitudinem Trochilorum proprius accedunt.

Florum autem nectare pasci hanc auiculam, quae eiusdem Viri Cl. est coniectura, plane credo. Docet hoc tota rostri conformatio, quae a Certhiarum rostris longe est diuersa, quarum insuper cum Mellisugis similitudo omnino tantilla est, vt satis mirari nequeam, Ornithologos hactenus omnes vtrasque uno eodemque genere comprehendisse.

DESCRIT.

* Carmosinrother Baumläufer (*Certhia coccinea*)
G. FORST. *Goetting. Magaz.* 1780. *Stück IV.*
pag. 347.
Certhia (*coccinea*) rectricibus remigibusque ni-

gris, reliquo corpore coccineo. **B L U M E N B.**
Handb. der Nat. Gesch. 2. Aufl. pag. 190.
** ZIMMERMANNS *Reise um die Welt.* pag. 79.



Mellisuga coccinea. Carmosinrother Honigsauger

DESCRIPTIO
MELLISUGAE COCCINEAE.

Tabula quarta.

Maxima congenerum, magnitudine Pafferis.

Rostrum capite multo longius, incuruum, compressum, superne carinatum, maxilla inferiore, ut in Trochilis, vaginante inferiorem, in apice tubulatum, albescens. *Nares* minimae, in squama fornicata sitae, qua obteguntur.

Caput paruum, depresso pennis minimis, duriusculis tectum. *Gula* pennis longioribus, quam reliquae, densioribusque, *corpus* vero totum pennis mollibus vestitur.

Alarum ad dimidiam caudae longitudinem pertingentium remiges numerantur sedecim, quarum secunda longissima, octo vero primi, totidemque secundi sunt ordinis.

Cauda breuis: rectrices duodecim, duriusculae, acuminatae. *Pedes* mediocres, sed respectu congenerum longi, scutis tecti. *Digiti* mediocres, medius lateralibus paulo est longior, et cum externo basi concretus. *Pecticus* omnium breuissimus. *Pedes*, *digiti*, vngues albicant.

Color pennarum coccineus, rectrices vero, remigesque nigrae, alarum rectrices maiores pariter nigrae sunt, margine vero coccineo praeditae. Remix decima quinta latere interno, decima sexta tota alba. Alae margo, et basis pennarum gutturalium albent. In exemplari, unde imago nostra petita est, vertex et humeri aurantii erant coloris, cum et ille et hi in exemplari Musei Goettingensis rubescant: quod exemplar, cum sit coloribus omnino saturatis, et minori natura, pullum esse suspicor.

M E N S U R A E.

| Longitudo totius rauis | 5" | 10" | 5''' |
|--|----|-----|------|
| Longitudo rostri ad frontem | 0, | 11, | 8 |
| Longitudo pedis | 1, | 0, | 0 |
| Longitudo digiti medii (vnguis 2" 2'''') | 0, | 8, | 0 |
| Longitudo digiti postici (vnguis 2, 5) | 0, | 6, | 0 |
| Longitudo caudae | 1, | 8, | 0 |

Merops



Merops Spiza.*

Auem hanc ab omnibus rerum naturalium curiosis perperam descriptam, alieno generi contributam, nec a quoquam bene delineatam, deprehendo. EDWARDS *Musicapam* vocat. MOEHRINGIUS illi pariter commune aliquod cum quibusdam aliis, de quibus dubito, satisne ad eius similitudinem accedant, illudque nouum et peculiare assignat genus, cui *Colii* nomen imponit.** KLEIN *Sylviis* eam annumerat, quia corporis habitum Rubeculae similem EDWARDUS dicit.*** LINNAEUS incertus, quo eam referat, decima systematis sui editione inter *Currucas* et *Motacillas* posuit, in duodecima autem BRISSONIUM fecutus, in Certhiis recenset: cui et III. BUFFON assentit. Certissimum tamen est, eam ad nullum horum generum referendam esse, sed re vera ad *Meropes* pertinere, cum quibus in characteribus diagnosticis omnibus, scilicet rostri figura, narium et forma et situ, totaque corporis structura accuratissime conuenit. LINNAEUS facile in errorem hunc incidere poterat, quippe cui avis ipsa non nisi ex icone Edwardina cognita erat, in qua rostri figura vitiosissime expressa est; sed vix comprehendere possum, quo modo BRISSONIUS et BUFFONIUS alieno illam generi inferere potuerint, quibus tamen plures huius speciei varietates noscere et examinare contigerat. Paene dixerim, omnes huius auiculae delineatores conspirasse inter se, ut capiti, rostrum Mellisugae iungerent, vt vibrissas in basi eius omitterent, et narum figuram prae effingerent; omnes autem historiae naturalis scriptores ipsius avis contemplationem omisisse, et vitiosis istis imaginibus fidentes, iisque deceptos a vera via in genere constituendo aberrasse. Icon, quam SEBA exhibuit, caeteris omnibus, quod mireris, accurior est; Edwardina autem effigies, quod magis adhuc mirandum, omnium est pessima.

Variae, quoad rostri pennarumque colores, huius speciei extant varietates, maioris minorisue momenti, quarum eas, quae notatu dignissimae videntur, recensebo. Monendum autem harum

* Motacilla (Spiza) viridis, remigibus primori-
bus nigricantibus. LINN. *Syst. nat. ed. 10. I.*
pag. 188.
Groene Fliegenfänger. HOUTTUYN *Nat. Hist.*
Deel. I. Stiick V. pag. 584.
Certhia (Spiza) viridis, capite remigibusque ni-
gricantibus. LINN. *Syst. nat. ed. 12. I.* pag 186.

Le Guit-Guit vert et bleu à tête noire. BUFFON
hist. nat. des Oiseaux. pag. 534.


** Genera av. pag. 36 No. 16.

*** Birds I. pag. 25 for Shape of body he is
like a Robin Red-Breast.

Taf. V.



Merops Spiza. Hochbeinichter Bienenfresser



hārum eam, quam quarto loco posui, me non nisi III. BUFFONII fide fretum inter eas recepisse, licet firmiter apud me constet confilium,

Nullius addisti iurare in verba magistri.

Nam icones eius in confilium vocans, cum ipsam auiculam videre nondum contigit, non specie tantum, imo genere, a Merope nostra differre, vereque ad Mellisugas pertinere videbatur; cum autem experientia docuerit, quam parum fidei iconibus istis habenda sit, fas esse puto, donec autopsia contrarium docuerit, Buffonio, cui eam cum prima tertiaque comparare licuit, credere, non maius discrimen hanc inter caeterasque interesse, quam quod varietates distinguat.

*Prima varietas** quam hic describemus, et cuius iconem tabula quinta exprimendam curauimus, est pileo et maxilla superiore nigris, remigibus restringibusque item nigris, marginibus tamen viridibus, et inferiore maxilla alba.

*Secunda varietas*** a priori, cui caeterum per omnia est similis, tantum modo differt gutture pariter ac caput nigro, rostro toto albo, pectore et abdomen viridi-cyaneis.

*Tertia varietas**** notabilis est capite et teetricibus alarum cyaneis, pedibus flaviis. Pro femina forsan vel pullo masculo habenda. In Edwardina iconē maxilla superior alba est, inferior nigra, in Daubentoniana rostrum totum nigrum, lora alba.

Quarta

* The green black-cap Fly-catcher. EDW. *Birds I.* tab. 25 pag. 25.

Der grüne Fliegenschnapper mit dem schwarzen Kopf. SELIGM. austl. *Vögel. I.* tab. 49 (fig. Edward.)

Sylvia viridis, capite nigro. KLEIN *Hist. av.* p. 80.

Grüner Wenzel mit schwarzem Kopfe. KLEIN *Hist. der Vögel.* pag. 81.

Der blaugrüne Mönch. HALLE *Nat. Gesch. II.* p. 341. Certhia splendide viridis, capite splendide nigro, restringibus lateralibus nigricantibus, oris exterioribus viridibus. Certhia Brasiliensis viridis atricapilla. — Le Grimpereau verd à tête noir du Bresil. BRISS. *Orn. III.* pag. 633.

Cerzia verde con testa nera del Brasile. Certhia Brasiliensis viridis atricapilla Briss. GER. *Orn. II.* p. 60. Le Guit-Guit vert à tête noire BUFFON *hist. nat. des Ois. V.* pag. 535.

Grimpereau à tête noire du Bresil. DAUÉ. *Pl. enl. No. 578.*

** Auicula Americana altera. SEBAE *Thes. II.* p. 5 tab. 3 fig. 4.

Sylvia, Auicula Americana altera Sebae. KLEIN *hist. av.* pag. 79.

Weißschnabel. KLEIN *Hist. der Vögel.* pag. 80.

Merrem *av. ic. L.*

Der grüne Fliegenstecher. HALLE *N. G. II.* p. 344. Certhia superne splendide viridis, inferne saturate caerulea, capite et gutture splendide nigris, restringibus saturate viridibus. Certhia Americana viridis atricapilla. Grimpereau verd à tête noire d'Amérique. BRISSON *Orn. III.* pag. 634.

Cerzia verde con capo nero d'America. Certhia Americana viridis atricapilla Brisl. GER. *Orn. II.* p. 60.

Le Guit-Guit vert et bleu à tête noire BUFFON *hist. nat. des Ois. V.* pag. 534.

*** The Blue headed green Fly-Catcher EDWARD. *Birds I.* pag. 25 tab. 25.

Der blauköpfige grüne Fliegenschnapper. SELIGM. austl. *Vögel. I.* tab. 49 (fig. Edw.)

Sylvia viridis capite cyaneo. KLEIN *Hist. av.* p. 80.

Grüner Wenzel mit blauem Kopfe. KLEIN *Hist. der Vögel.* pag. 81.

Der grüne Mönch. HALLE *Nat. Gesch. II.* p. 342.

Certhia dilute viridis, viridi saturatiore in pectore maculata; gutture candido, capite superiore, superioribusque alarum teetricibus minimis cyaneis, restringibus lateralibus nigricantibus, oris exterioribus dilute viridibus. Certhia Brasiliensis viridis — Le Grimpereau verd du Bresil. BRISS. *Orn. III.* p. 631.

C

Blaukopf.

Quarta denique *varietas* * in toto corpore est viridi-oliacea, maxilla inferiore carneal. Nisi forte, quod suspicari me iam supra dixi, ad aliud plane genus referri debet, feminam esse credibile est.

Omnis varietates hactenus enumeratae habitant in diuersis *Indiae occidentalis* regionibus, *Surinamo*, *Guyana* et *Mexico*. De moribus vietuque earum nihil constat.

D E S C R I P T I O VARIETATIS ATRICAPILLAE MEROPIS SPIZAE.

Tabula quinta.

Congenerum minima, *magnitudine* Motillae rubeculae.

Rostrum capite longius, compressum, subrectum, integrum, utrinque carinatum. Maxilla superior longior inferiore, apice subincurua, nigra; inferior latere subcanaliculata, eadem, et apertura oris ex flauescente-alba. *Nares* in rostri basi, capistro semitectae. Ad basin mandibulae superioris prope oris angulum existant *Vibrissae* quaedam minutae. *Caput* parvum, *collum* breve, *Corpus* gracile elongatum.

Alae complicatae ad tertiam longitudinis caudae partem pertingunt.

Pedes mediocres, sed longiores, quam in congeneribus, scutis testi, digitus medius in basi cum externo paululum cohaeret. Digitus medius et posticus eadem fere longitudine gaudent, exterior paulo brevior, interior omnium minimus est. Pedes et digitii obscure fusci. *Vngues* satis validi, subincurui, acuti, nigri.

Cauda brevis: Rectrices duodecim, rotundatae, quarum medii lateralibus paullo sunt breviores.

Color penumarum viridis, viridi aeris similis, in alarum tectricibus saturatissimus, in collo magis ad flauum inclinans. *Pileus*, *Genae* et *crura* atra. Remiges rectricesque nigrae, viridem colorem reflectentes, margine viridi.

M E N S U R A E.

| | | | |
|--|----|-----|-----|
| Longitudo totius avis usque ad vropygium | 3" | 3" | 0"" |
| Longitudo eius ad caudam extremam | 4, | 10, | 0 |
| Longitudo rostri ad oris angulum | 0, | 8, | 5 |
| Longitudo pedis | 0, | 9, | 0 |
| Longitudo digitii medii (vnguis 2" 3") | 0, | 7, | 8 |
| Longitudo caudae | 1, | 7, | 0 |

Musci.

Blaukopf. MÜLLERS *Nat. Syst. II.* p. 257. Der ganz grüne Batimläuffer. SELIGM. ausl. Vögel V. tab. 38. (fig. Edwardi.)

Cerzia verde del Brasile. Certhia Brasiliensis viridis

Briff. GERINI *Orn. II.* pag. 60.

Le Guit-Guit vert et bleu à Gorge blanche BUFFON

hist. nat. des Oif. V. pag. 536.

* The All-Green Creeper. EDW. *Glean. III.* p. 287

hist. nat. des Oif. V. pag. 537.

Le Guit-Guit tout vert. BUFFON *hist. nat. des*

Oif. V. pag. 537.

Grimpereau vert de Cayenne. DAUBENT. *Pl. enl.*

No. 682.

tab. 348 fig. 2.



Muscicapa ferruginea Rostiger Fliegenfänger

Muscicapa ferruginea.

Nouam hanc Muscicaparum speciem ex *Carolina* adiectam esse *Dolmer* referebat, in cuius apparatu eius conspiciendae copia mihi facta est, quapropter mirum mihi videri potuisset, quod nec *CATESBEIUS*, nec quiquam alias rerum naturalium scriptor eius mentionem faciat, nisi postea plures inde allatas nouas species videndi, occasio mihi praebita fuisset.

Nidus, qui cum ouis impositis vna circumferebatur, quem tamen genuinum esse fidem meam non interpono, hemisphaericus erat, intorsus graminibus, pilis equinis intertextis effulatus et substratus, extrorsus hypno conuestitur. In diametro tres fere pollices patebat. Ouorum figura exacte ouata erat, apice aliquanto obtusiori, longitudo octo linearum, color ex viridi albicans, maculis ferrugineis.

DESCRIPTIO

MUSCICAPAE FERRUGINEAE.

Tabula sexta.

Magnitudo Fringillae Carduelis, *Statura* congenerum. *Maris* et *feminae* *forma* et *color* adeo similis, ut alterius descriptio utriusque conueniat. —

Rosfrum paruum, latum, basi depresso, nigrum, in margine autem castaneum. *Maxilla* superiore sublongiore, apice incurva, emarginata. *Nares* ouales, in rostri basi, prope frontem.

Caput paruum, oculi pone oris angulum. *Aures* pennis longis tectae.

Corpus gracile, pennis mollibus vestitum.

Alae ad vropygium porriguntur.

Crura brevia. *Pedes* mediocres, digitique scutis tecti, fuscii. *Digitus medius* longissimus; laterales paulo breviores, posticus minimus.

Cauda

MUSCICAPA FERRUGINEA.

Cauda breuis, forma singulari conspicua. Rectricum duodecim 1, 1, breuissima, 2, 2 et 6, 6, eiusdem longitudinis, et breuiores, quam 3, 3, 4, 4 et 5, 5 fere aequales.

Pennarum color superne ex fusco murinus, subtus ex flavo albus; guttur candidum, alae nigrae pennarum marginibus ferrugineis. Vropygium griseo-fuscum. Rectrices nigrae marginibus fuscescentibus, 1, 1, vero albae, scapo nigro praeditae. Pagina inferiore omnes rectrices cinereo imbutae erant colore.

M E N S U R A E.

| | | | | | |
|---|----|------|----|-----|----|
| Longitudo ad caudam extremam | - | - | 5" | 8" | 0" |
| Longitudo ad vropygium | - | - | 3, | 9, | 8 |
| Longitudo rostri ad frontem | - | - | 0, | 3, | 9 |
| Longitudo rostri adoris angulum | - | - | 0, | 6, | 2 |
| Longitudo pedis | - | - | 0, | 10, | 0 |
| Longitudo digiti medii (vnguis | 2" | 0'') | 0, | 7, | 8 |
| Longitudo digitorum lateraliuum (vnguis | 1, | 5) | 0, | 5, | 6 |
| Longitudo digiti postici (vnguis | 1, | 9) | 0, | 5, | 0 |
| Longitudo caudae | - | - | 1, | 8, | 0 |

L I P S I A E,

L I T T E R I S B R E I T K O P F I S.

A V I V M
RARIORVM ET MINVS COGNITARVM
ICONES ET DESCRIPTIONES
COLLECTAE
E GERMANICIS LATINAЕ FACTAE
ET
VIRO ILLVSTRISSIMO, FRIDERICI MAGNI AMICO
D O M I N O
C. A. LIBERO BARONI DE ZEDLIZ
DICATAE

A

B L A S I O M E R R E M

PH. D. MATH. ET PHYS. IN REGIA DVISBURGENSI ACADEMIA P. F. O.
SOC. R. SCIENT. GOTTING. LITTERAR. COMMERC. IVNCTO.

FASCICULUS SECUNDUS.

L I P S I A E
EX BIBLIOPOLIO Io. GODOFR. MÜLLERIANO
CIOCCCLXXXVI.

LIBRAIRIE DE GUYOT & CIE
52, RUE DES ÉCOLES, 56

Charlton Richmond

*Crura magna, fortia. Pedes breves cum digitis scutis teguli sunt. Digi-
ti semipalmati, medius longissimus, laterales paulo breviores, posticus omnium breuissimus. Pede-
s coloris sunt sordide rubescens, nisi ille a sole immutatus fuit. Vnguiculae magnae, valde incuruae, acutae,
coloris cornei.*

*Cauda rectricum duodecim, longa, pendula, aequalis, ab aue vero irritata sublata
rotatur.*

*Pennarum color ater. Crista, alarumque tactrices maiores albae, scapo pennarum
nigro, harum quoque apicibus nigris. Alarum tactrices minores, eaeque pennae, quae iugulum
vestiunt, ex magna parte albo donantur margine.*

M E N S U R A E.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|------|------|
| Longitudo ab apice rostrum ad caudam extremam | - | - | - | 1' | 8" | 6''' | 0''' |
| Longitudo rostrum ad frontem | - | - | - | 0, | 0, | II, | 0 |
| Longitudo pedis | - | - | - | 0, | 2, | 6, | 2 |
| Longitudo digiti medii (Vnguis 6" 3'') | - | - | - | 0, | 2, | 3, | 7 |
| Longitudo digiti externi (Vnguis 4, 5) | - | - | - | 0, | I, | 9, | 2 |
| Longitudo digiti interni (Vnguis 6, 5) | - | - | - | 0, | I, | 9, | 2 |
| Longitudo digiti postici (Vnguis 5, 8) | - | - | - | 0, | I, | 2, | 0 |
| Alis expansis | - | - | - | 3, | I, | 3, | 0. |

L I P S I A E,

LITTERIS BREITKOPFIIS.



E R R A T A
IN FASCICULO PRIMO.

- Pag. 1. lin. penult. *Coyoltotl* lege *Coyoltototl*
— 2 — 6 *Sebam nostram*, lege *Sebam, nostram*.
— 12 *Coyoltotol* l. *Coyoltototl*.
— 3 — 3 *aut maxime* lege *maxime autem*.
— 5 — 20 *ea* lege *eae*
— 7 — 11 *innumerat* lege *annumerat*.
-



Taf. VII.

Waiskoptiger Adler.
Aquila glaucopis.



Aquila Glaukopis. *

Exemplo LINNAEI, Papilionum Phalaenarumque numeroſa genera in phalanges familias-
quæ, quarum quaeque propria denominatione gaudet, diuidentis, Auium quoque maiora
genera diuidere, et familias istas nominibus etiam certis distingue, iisque species, ad has fami-
lias pertinentes, addito nomine triuiali, missò autem generico, appellare, non incongruum vide-
tur. Falconum itaque genus, specierum numero infigne, in duas familias distribuendum puto,
quarum alteram Aquilae, alteram Circi conſtituant. Ex illis nouae cuiusdam speciei descriptio-
nem, iam olim in Miscellaneis Zoologicis a me exhibitam, hic repetendam sumfi; cum partim
icon ibi data nimis exigua, nec inde accurata satis, partim in paucis tantum libri exemplaribus
coloribus picta exſtet. Omittendam autem hoc loco putauit offium, muscularum, internarumque
partium anatomen, amplamque mensurae singularum partium recensionem, ea tantum retinens,
quaes ad historiam eius, et descriptionem faciunt.

Diu dubitauit, Aquilisne an Circis inferenda fit haec avis, donec tandem pennarum crura
obtegentium longitudo, pedes breues fortesque, ingens et magno vncō praeditum, basi vero
rectum aliquantum rostrum, digitus longi validique, vngues adunci valde ac robusti, supercilia pro-
minentia, oculi grandes, corporis ex densis molibusque pennis vſtimentum, et situs sedentis
eretius, locum ei inter Aquilas vindicare viderentur.

Pullus adhuc e nido, a parentibus in monte Dransberg, prope Gottingam conſtructo, a
rufico quodam ad me ferebatur, a quo tamen vltiorem ipsius notitiam nullam accipere poteram.
Colores, durante eo tempore, quo auem educaui, parum immutati fuerunt, nisi quod cera, prius
obſcure

* Weifsköpfiger Adler. MERREM *Verm. Abhandl. aus der Thiergeſch.* Seite 110. Taf. 3.

obscure cinerea colorem flauum indueret, pennarum autem color saturatior fieret, quem etiam ad tempus vsque, quo descriptio eius et delineatio coniectae sunt, retinuit, anno tunc maior.

Allatam mox pede ligabam, sed nullum pertinax cibum capere volebat, donec vinculis liberatam in exiguo quodam hypocausto circumvolitandi libertate donarem, tum vero maxima cum voracitate cibos absfumebat, ab eoque tempore in eadem mitiori reddenda, fruſtra laborauimus, licet faepius de die et a me, et ab aliis visitaretur. Carnem amabat crudam recentemque, adeo ut quamcumque aliam, coctam aut ad putredinem iamiam inclinantem, per plures licet dies appositam, obſtinatum tenens iejunium, ne attingeret quidem. Quia autem caro ei recens et fanguinolenta non quotidie poterat apponi, interdum, sed raro tamen, et exiguae portiunculas bibentem vidi. Adolescenti Monedulas duas, Sciurumque adposui, quos quidem, quamdiu carnis crudae copia abundaret, nulla iniuria affecit: non negauerim tamen fruſtas nonnunquam vitae illorum infidias fuisse; quamuis enim nec dum agili volante remigio celeriores effent, interdiu tamen sub corbe apposita latitabant, sub qua etiam sciurus, fera demum vespera prodire ausus, nuces fibi auellanas suas colligebat. Non potuit tamen posterior hicce saeuitiam eius effugere, in quo necando occupatam, eo ipso momento intrans Aquilam deprehendo, vnguesque in miseri animalis corpus infigentem, itaque in caput occidentem, conspicio. Qua caede peracta, devoratum totum cum pilis ossibusque animalculum tam bene consumfit, ut nulla eieclarum pilarum vestigia postea inuenta fuerint.

Miro quodam modo faeces, principio omnino fluidas, postea autem indurandas calcareasque, cauda in altum elata, per trium quatuorue pedum longitudinem, eiaculabatur.

Sonum, quem edidisset aquila nostra, omnino nullum audire contigit.

D E S C R I P T I O A Q V I L A E G L A V C O P I D I S .

Tabula septima.

Roftrum haud longe a basi tramite rectum, apice incuruum, vncō terminatur grandi, incuruo, acuto; fere integrum, et absque vlo denticuli vestigio, prope ceram tamen, et ante vncum

vncum subemarginatum. Mandibula inferior breuissima, basi latissima, apice rotundata, perfecte a mandibulae superioris canali includitur. Rostrum basi dilute cinereum, apice fusco-nigrescens.

Cera albo-cinerea, superimbuta colore citrino pulcherrimo. *Nares* magnae, ouales, antice eleuatae. *Oris* margo et angulus cute flava vestiti sunt; oris rictus et *lingua* rosea.

Lingua fere integra, apice tamen subbifida, et subcanaliculata, carnea, apice fere corneo.

Lora triangulum formant, pennis minimis et albentibus vestitum, quibus vibrissae quae-dam nigrae incumbunt, in quibus, ne microscopii quidem ope radii dignoscuntur. Similes, sed breuiores hisce vibrissae sub palpebris inueniuntur.

Oculi orbiculati, *Iride* ex albo-grisea, cui colori non nihil flavi admixtum videtur. *Pupilla* maxima, orbicularis, nigra. *Supercilia* prominentia verticis figuram fere triangularem reddunt. *Palpebrae* maxime, totum oculum obtegentes, pennulis albis vestitae.

Caput magnum, crassumque, pennis indutum paucis, paruis, acutis, reliqui corporis pennis durioribus; quo Aquila nostra ad barbatae aquilae Cl. G M E L I N I similitudinem accedit.

Collum breue, forte, pennis multis densisque vestitum.

Alae complicatae caudae apicem attingunt. *Remiges* viginti octo, quarum prima brevis, secunda longior, tertia quartaque omnium longissimae. Quatuor hae priores remiges apice praeditae sunt angusto, et acuminato, in media autem earum longitudine subito radiorum longitudo augetur, angulo fere recto. A Remige inde quinta paullatim longitudine decrescunt, apice sunt rotundiore ac latiore, omnesque radii eandem seruant longitudinem. *Ala notha* pennis quatuor, subacuminatis constat. *Tectrices* alarum *superiores* maiores ordinatae, grandiusculae, rotundatae, molles; minores confusae, rotundae, minimae, densae: *inferiores* superioribus maiores, confusae, mollissimae.

Corpus elongatum, forte, pennis magnis, mollibus, densisque et plumis mollescens vestitum.

Crura brevia, pennis acutis, mollescens ultra calcaneum per duorum pollicum longitudinem prominentibus dense obtecta. *Pedes* mediocres, antice semilanati, postice nudi, et eodem modo ac anterior a pennis nuda pars, scutis, in latere autem, basique digitorum squamis tegiti. *Digiti* mediocres, superne scutis, subtus cute scabra vestiti. *Pedes* digitique flavi. *Vngues* maximi, fortes, adunci, nigri.

Cauda cuneata. *Rectrices* duodecim rotundatae. *Tectrices* caudae inferiores mollescens, longissimae.

Color pennarum. Pileus albo-flavescens, lineolis lunatis, fuscis. Genae, guttur, latera (paucis maculis fuscis in hypochondriis exceptis), venter, crura, axillae, crissum ex flavescente alba. Vropygium sordide album lineolis nigris. Dorsum et pectus obscure fuscum. Superiores alarum tectrices fuscae, margine fuscum. Ala notha maioresque alarum tectrices obscure castaneae, margine albescente. Remix prima tota nigra; 2, 3, 4, 5 nigrae, in barbae autem exterioris amplificatione nigro-griseae, 4, 5 nigro fasciatae: barbae interioris amplificatio alba. Reliquarum 6 usque ad 16 nigrae, fasciis atris; 17 ad 28 e fusco nigrae. In pagina inferiore priores quinque apice donantur nigrescente, caeterum albae; Reliquae sordide albae sunt, fasciis nigrescentibus. Rectrices superne rufo-fuscae, fasciis sex nigris subtus sordide albae, fasciis similibus praeditae.

MENSURA E.

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|-----|
| Longitudo totius auis ab apice rostrum ad caudam extremam | - | - | 1' | 9" | 3"" |
| Longitudo auis ab apice rostrum ad apicem vnguicularum | - | - | 1, | 6, | 9 |
| Alis expansis | - | - | 4, | 0, | 0 |
| Longitudo rostrum ad frontem | - | - | 0, | 1, | 7 |
| Longitudo rostrum ad oris angulum | - | - | 0, | 1, | 9 |
| Longitudo alarum complicatarum | - | - | 1, | 3, | 0 |
| Longitudo cruris | - | - | 0, | 3, | 9 |
| Longitudo pedis | - | - | 0, | 3, | 2 |

Longitudo

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|----|----|----------------|
| Longitudo digitii medii absque vngue | - | - | - | - | O' | I" | 6''' |
| Vnguis (secundum curuarturam mensi) | - | - | - | - | O, | O, | II |
| Longitudo digitii interni | - | - | - | - | O, | I, | O |
| Vnguis | - | - | - | - | O, | I, | $I\frac{2}{3}$ |
| Longitudo digitii externi | - | - | - | - | O, | I, | I |
| Vnguis | - | - | - | - | O, | O, | 8 |
| Longitudo digitii postici | - | - | - | - | O, | O, | $8\frac{1}{2}$ |
| Vnguis | - | - | - | - | O, | I, | $2\frac{1}{2}$ |
| Longitudo caudae | - | - | - | - | O, | 8, | 6. |



+Lanius Atricapillus.

De noua hacce, quantum équidem sciam, Laniorum specie, nihil amplius Lectoribus referre licet, nisi veri quandam speciem prae se ferre, ex Surinamo allatam esse.

D E S C R I P T I O L A N I I A T R I C A P I L L I

Tabula Octaua.

Magnitudo Fringillae Carduelis.

Rostrum latissimum, subdepressum, maxillis longitudine fere aequalibus, superiore tamen vnculo suo paullulum super inferiorem prominente, emarginata. *Oris* riſus amplus. *Rostrum* nigrum; maxillarum marginibus membranaceis: superioris maxillae margine fusco, inferioris albido.

Nares paruae, obouatae, apertae, capiftri pennis fetaceis semitectae, fronti proximae.

Caput sat magnum, pennis paruis, duris denfisque arcte veflitum. *Supercilia* prominentia. *Oculi* medii. *Aures* pennis longis, angustis decompositis obtectae.


Collum breue.

Corpus elongatum, forte, pennis amplis veflitum.

Alae, non omnino dimidiā caudae longitudinem attingentes, *Remigibus* constant fedecim, quarum eae, quae primi sunt ordinis, acuminatae, secundariae vero rotundatae existunt. *Alarium testrices* magnae et ampliae.

Crura longissima, robustaque. *Pedes* longi, *Digi*ti mediocres, *Vnguiculae* fortissimae aduncae atque acutae. *Digitorum* medius longissimus, internus paullo illo, et hoc ipso adhuc brevior externus, posticus breuissimus, quamvis vngue fortissimo, maximoque praeditus. *Pedes* digitique scutis tecti, fusi, subtus cute aspera instructi.

Cauda



B. Merrem pinxit

G. G. Finschner sc.

Zweifelhafter Würger.
Lanius atricapillus.

Cauda mediocris constans Reëtricibus duodecim mollibus, rotundatis, quarum mediae binae longissimae, lateralium vero longitudo per interualla minuitur, adeo, vt interualla haecce crescant, quo magis extremae cuique proprius accedunt.

Color pennarum. Pileus ad nucham vsque, minoresque Alarum teëtrices caeruleo-aatrae, adeo tamen, vt pro diuersa luminis reflexione viridi-atrum quoque referant colorem. Dorsum murinum, reliquum corpus canum, subtus vero dilutius. Crissum fordide album. Alae caudaque ex nigro fuscae, marginibus remigum secundariarum, alarum teëtricum, reëtricum autem (6, 6 exceptis) apicibus albis, in 1, 1 maximis, in 5, 5 minimis. Reëtricum quatuor intermediarum basis cana, qui color in margine ad medium vsque earum longitudinem extenditur.

M E N S U R A E.

| | | | | |
|---|---|----|----|----------|
| Longitudo totius auis ab apice rostrri ad caudam extremam | | 5" | 1" | 3"" |
| Longitudo rostrri vsque ad frontem | - | - | - | 0, 5, 6 |
| Longitudo rostrri ad oris angulum | - | - | - | 0, 8, 0 |
| Longitudo alae complicatae | - | - | - | 2, 6, 0 |
| Longitudo cruris | - | - | - | 0, II, 5 |
| Longitudo pedis | - | - | - | 0, 8, 3 |
| Longitudo digitii medii absque vngue | - | - | - | 0, 4, 3 |
| Vnguis | - | - | - | 0, 2, 0 |
| Longitudo digitii interni | - | - | - | 0, 3, 8 |
| Vnguis | - | - | - | 0, 1, 7 |
| Longitudo digitii externi | - | - | - | 0, 4, 0 |
| Vnguis | - | - | - | 0, 1, 8 |
| Longitudo digitii postici | - | - | - | 0, 3, 0 |
| Vnguis | - | - | - | 0, 2, 2 |
| Longitudo caudae | - | - | - | I, II, 5 |

Trog-



Trigonum Genus.

Auium istarum, quae in patria sua *Curucui* aut *Curucuae* denominantur, genus proprium primus MOEHRING constituit, separavitque a picis, quibus altera ex binis tribusue speciebus, eo tempore notis, inferi consueuerat. Ab antiquioribus nempe naturae auiumque systematum conditoribus, aues istae, quas *Curucui* nomine MARCGRAVIUS, *Tzinitzan* nomine FERNANDEZ descripsierunt inter Picos recensebantur, quibuscum nullo modo, digitorum situ excepto, minime vero ipsa pedum figura, rostri forma, corporis habitu conueniunt: Patris autem FEUILLEÉ *Psttacuus flammeus* omnino negligebatur; donec MOEHRINGIUS MARCGRAVII auem *Curucui* cum alia quadam, ab eodem auctore descripta, aut ad hoc, aut ad Cuculi genus referenda aue, *Guira Acangatara* dicta, in nouum quoddam genus, cui *Trogoni* nomen fecit, coniungeret; * quem secutus BRISSON, cui, quum ex autopfia binae nouae species innotuissent, is quidem Guiram Acangataram ab hoc genere separauit, Cuculisque inferuit, deinde vero, characteres huius generis, seruato, quo vsus Moehringius, nomine latino, patro autem *Curucui*, absque i finali in denominationem gallicam tracto, firmiores, accuratioresque stabiliuit. BRISSONII vestigia prementes LINNAEUS, BUFFON, PENNANT, caeterique recentiores naturae historiographi, aut latino nomine *Trogon*, aut patro *Curucui*, *Curucuae*, vel *Curucu*, aut germanico *Baumhacker* genus hocce nouum a reliquis distinxerunt. **

Rostri

* *Genera avium* pag. 85. Vbi sequentes stabilit vit characteres: „Rostrum capite brevius, incurvum sensim. Rectrices octo? Tibiae breves, magnam partem plumosae. Digihi antice bini, totidemque postici.“

** *Trogon*. MÖHRING av. gen. pag. 85.

Couroucou. BRISS. Orn. IV. pag. 162.

LINN syst. nat. ed. 12. I. pag. 167.

SCOPOLI introd. pag. 479.

LESKE Nat. Gesch. 2 Ausg. I. Seite 292.

CZENPINISKI diff. anim. gen. pag. 105.

ZIMMERM. tab. affin. pag. 184.

Baumhakker MÜLL. Linn. Nat. Syft. II. Seite 202.

ERXL. Nat. Gesch. Seite 218.

BOROWSKY Nat. Gesch. II. Seite 122.

Indianische Baumhakker. Onom. hist. nat. compl. VII. Seite 590.

Kurukujen BRÜNN Zool. pag. 82.

Les Couroucou ou Couroucouais. BUFF. hist. des Oif. VI. pag. 286.

Curucui. PENNANTS gen. of birds pag. 12.



Kitterlein del.

Rothbauchiger Kurukku.

Windner sc.

Trogon Curucui.

Rostri forma, pedumque, totoque corporis habitu, et caudae longitudine quodammodo Psittacis conueniunt Trogones, vnde minime mirandum, quod speciem a se descriptam *Psittaci* nomine Rev. Pater FEUILLEÉ insignierit. Minor multo rostri cum Laniorum rostris similitudo est, licet in diuersis eiusdem speciei individuis variare videatur, atque interdum, ut in nostra aue, *tabula nona* delineata, dente versus apicem instructum sit; quae rostri conformatio in eo quoque, quod KOELREUTER descripsit, exemplari locum habuisse videtur; cuius tamen nec quicquam excusandus error, quo admissio *Lanium digitis duobus anticis totidemque posticis* * appellandum censuit, quum praeter hanc vnam, vtrisque interdum communem conformatioinem rostrum, nihil omnino sit alterius rei, cuius intuitu Laniis similes dicendi sint Trogones. Non autem longe a vero aberrauit EDWARDS, speciem a se descriptam *Cuculum* vocans, cum totum corporis habitu, voce, vietu, moribusque arcta sane affinitas cum Cuculis huic fit generi: quaè etiam in cauissimis est, cur dubitem, vtrum FERNANDEZII *Tzinitzan* ** huic generi inferi satis recte possit; nam fructibus vesci dicitur, cum contra ea, teste Ill. Comite A BUFFON Trogones insectis vescantur. In ipsa tantum avium harum patria, aut instituta anatomica internarum partium inspectione certiores de hac re fieri, verosque characteres naturales huius generis potuerimus confituisse, quibus iam sufficerit artificiales recensuisse.

Rostrum capite breuius, compressum, altum, obtusum, plerumque denticulato - serratum, basi vibrissis instructum.

Caput grande.

Oculi

* Nov. Comment. Petrop. XI. pag. 436.

** Avis est parua, columbae pene par, plumis multorum colorum vestita, quibus imagines mirae subtilitatis intexunt Indigenae (eius enim artis praeceilentia vniuerso orbi iam diu innotuere) et vtebantur festiis diebus, in bello, templis ac publicis tripudiis; Rostrum breve est, incuruum, pallidum, caput columbinum collumque; sed quae plumis virentibus ac nitidis vestiantur; pectus ac venter rubra sunt,

praeter eam eius partem, quae proxima est caudae; illa enim cyaneo, carentique promiscue tingitur colore; cauda superne virenti ac inferne nigro, alae partim albo, et partim subnigro, atro oculi, Iris luteo, sed in coccineum vergente, verum crura ac pedes cinereo. Vivit in calidis iuxta Oceanum australem, alitur in caueis, et vescitur fructibus; pulcherrima avis est, si quae alia, sed neque cantillat, neque (quod sciem) eduli carne constat. FERNAND. av. Nov. Hisp. cap. 43. pag. 23.

Oculi magni.

Aures tectae.

Collum breve.

Corpus elongatum, teres, pennis mollibus, amplis deciduis dense tectum. *

Alae mediocres.

Cauda longissima; Rectricibus duodecim mollibus, rotundatis, quarum sex vel octo mediae longitudine aequales, reliquarum gradatim longitudine decrescentium, caudamque cuneiformem reddentium longitudinem valde superant.

*Crura pro portione corporis minima imbecillia. Pedes item minimi, imbecilles, breues, aut semilanati, aut toti ad exortum usque digitorum pennis vestiti. Digi-
ti parui, quorum duo antici, totidemque postici, et ex iis, quod in nullis aliis volatilibus, pedibus scansforiis praeditis obseruare licet, exteriore, tam antici quam postici, interioribus breuiores sunt. Vnguiculae imbe-
cilles, modice incuruae, acuminatae.*

Patria Mexico, Surinamum, Guyania, Brasilia.

Habitant in syluarum humidarum ramis inferioribus. **

Vita solitaria. ***

Volatus brevis, ex arbore in arborem. †

Victus

* BUFF. hist. des Ois. VI. pag. 296.

*** BUFF. l. c. pag. 296.

** BUFF. loc. cit. pag. 295.

† BUFF. l. c. pag. 296.

Vitius: Insecta. *

Vox similis sono Urucuae, saepe repetenda, quas mas foeminaque vicissim fibi acclamant. **

Venus sine dubio monogama. Nidificant bis in anno mensibus Aprili et Augusto. *Nidum* sruunt in arboribus cauis, vermiculosis, aut in defectu earum rostro sanas excauant arbores, ponuntque in iis *Oua* tria quatuorue alba, columbinis minora, a foemina sola incubanda, quo autem tempore a mare, in vicina arbore sedente, vigilias faciente atque canente nutritur. ***

Difficilis fane res videtur, rite instituta specierum huius generis definitio. MARCGRAV harum vnam eandemque in locis diuersis bis describere videtur, eamque priori loco *Curucui* † nomine insignire, altero loco *absque nomine Curucui similem auem* ‡ dicere; cui accedit, quod Curucui suo maculam cutaceam albam, qualis in gallinis obseruatur, sub quolibet oculo tribuat, a recentiori nullo naturae scrutatore memoratam; vnde dubium fane de hac specie moueri possit, nisi magnum discrimen descriptiones intercedat, secundum viua, vel aliena farcta repleta animalium exemplaria confeatas. Curucui huic BRISSON FERNANDEZII *Tzinitzan*, *Pitta-cumque flammeum viridem et cinereum, rostro ferrato* Patris FEUILLEÉ comparat, fine ulteriore, nisi ex descriptionibus, harum auium cognitione. Addit hisce EDWARDI *Cuculum* suum *viridem ventre flavo illumque secutus est LINNAEUS*, Ill. autem Comes A BUFFON *Trogonem ventre rubro* in *Tabularum pictarum 425* delineatum, quae pessima icon minime cum descriptione conueniens, eandem fane auem cum ea, quam videas in *tabula XIV. Tomi VI. Historiae Avium* repraesentare videtur, licet alterutri cum altera vix vlla in parte quaedam similitudo intercedat. Diuersarum fane specierum figuras putarem ex rostro in tabula picta mira conformatio, eiusdemque iconis cum figura a BUCHOZ exhibita similitudine, cum qua tamē, quoad rostrum minime conuenit, nisi rostrorum in tabulis illis Daubentonianis figurae plerumque pessime delineatae sint, Buchozii autem pigmenta nullo modo nomen mereantur picturarum naturae historiam illustrantium. Mitto itaque utrasque, in *de Sevii* iconē subsistens, quam si ei, quae in *tabula nona* huius Mantissae exflat, comparaueris, eique descriptionem Buffonii iunxeris, non erit, cur

E 2

dubites,

* BUFF. l. c. pag. 290. 296.

*** BUFF. l. c. pag. 289. 290.

** BUFF. l. c. pag. 286. 290. 296.

† Hist. Bras. pag. 211.

‡ Hist. Bras. pag. 219.

dubites, et meam auem, et Ill. Comitis *Couroucou à ventre rouge* eiusdem esse speciei. Hisce autem MARCGRAVII *Curucui* adeo similis est, vt hunc quoque iis facile coniunges: Ex quo patet EDWARDI error, *Cuculum* suum *ventre flavo* MARCGRAVII *Curucui* putans, a quo, vt ex facili insituenda iconum comparatione patet, satis superque alarum breuitate, pedibusque totis lanatis differt. Patris auten FEUILLÉE *Pstacum flammeum* cum Cuculo hoc magis conuenire, ac forsan eiusdem speciei esse, magnam habet verisimilitudinem. Hoc sane ex illis, quae hic prolata sunt, facile apparet, *Trogonem Curucui* Ill. Equitis A LINNÉ duas constitutere species, ad quarum alterutram MARCGRAVII *Curucui*, ad alteram vero EDWARDI *Cuculus* pertineant.

Alius nodus soluendus est. Ill. Comes a BUFFON *Cuculum* huncce EDWARDI vnius eiusdemque speciei esse putat, cum *Trogone Cayanensi viridi*, *Trogonem Cayanensi viridi ventre candido* BRISSONII, ab eodemque auctore iam pro mare foeminaque habitis; sed tamen diuersus ab hisce videtur esse. Reptrix namque tertia in Trogonibus Cayanensis viridibus breuior multo est sex intermediis, ad eiusdem fere cum iis longitudinis in Cuculo EDWARDI, qui et illis omnino minor est, et alis instructus breuioribus, paullo tantum ultra vropygium porrectis, cum in reliquis medium caudae longitudinem attingant. Quem autem proprio nomine, atque a reliquis speciebus separatum describit Ill. Comes, KOELREUTERI *Lanius* cum *Trogone isto Cayanensi viridi* adeo conuenit, vt nullum mihi certe superfit dubium, quo minus, ad eandem, cum eo speciem pertinere dixerim.

Notandum adhuc, *Trogonem Cayanensem cinereum* BRISSONII ab Ill. BUFFON pro varietate *Trogonis Cayanensis viridis* habitum, *Trogone* potius *ventre rubro*, vel *Cuculo* EDWARDI conuenire, ab illo autem caudae figura satis esse disinctum. Et quoque *Trogon longicaudatus Cayanensis* in *Tabula illuminata* 737 depictus longitudine caudae nimis a *Trogone ventre rubro* differt, quam, vt, Ill. Comitem secutus, huius tantum varietatem putare possem. Isdem quoque rationibus, *Trogonem Cayanensem cauda ferruginea* in iisdem *Tabulis* No. 736 depictum a *viridi* illo *Trogone* alarum breuitate nimis diuersum credo, quam vt pro varietate eius habere possem; cum potius *Cuculo* EDWARDI similis sit, eiusdem forsan foemina, vel pullus.

Hisce ita expositis, *Trogonum* species, cum characteribus ex corporis conformatione de-
promptis, hoc modo disponendae mihi videntur:

haemorrhoidalis 1. TROGON cauda longissima.

Couroucou gris à longue queue de Cayenne. *Planch. enl.* No. 737,

Un autre individu. BUFF. *Hist. des Ois.* VI. p. 288.

Un troisième individu. ID. *ibid.*

Der Curucui, welcher auf der Insel Dominiko unter dem Namen der Musikant be-
kannt ist. BUCHOZ. *Abbild. d. Vög.* Taf. 10. (mala)

Curucui 2. TROGON cauda longa, rectricibus octo intermediis aequalibus.

Curucui. MARCGR. *Hist. nat. Bras.* pag. 211.

RAII *syn. av.* p. 45.

JONST. *Hist. av.* p. 216. tab. 60. (fig. Marcgr.)

ONOMAT. *Hist. nat. compl.* III. pag. 545.

DICT. *des anim.* I. pag. 811.

Picus congener Curucui. WILLUGH. *Orn.* p. 96. tab. 22. (fig. Marcgrauii)

KLEIN *av.* pag. 28.

Le Couroucou verd du Brésil - *Trogon superne viridi - aureus, caeruleo et cupri*
puri colore varians, inferne coccineus; gutture nigro; rectricibus sex interme-
diis dorso concoloribus, apice nigris, tribus utrinque extimis albis, nigro
*transversim striatis - *Trogon Brasiliensis viridis*. BRISS. *Orn.* IV. pag. 173. (ex-*
ceptis synonymis quibusdam)

Curucu del Bräile. *Trogon Brasiliensis viridis* Briss. GERINI *Orn.* II. pag. 53.
tab. 187. (mala)

Couroucou à ventre rouge de Cayenne. *Planches enl.* No. 452?

Le Couroucou à ventre rouge. BUFFON. *Hist. des Ois.* VI. pag. 287. tab. 14. (bona.)

BUCHOZ *Abbildung der Vög.* Taf. 25. (mala.)

Der rauchfüssige amerikanische Baumhacker. HALLE *Nat. Gesch.* II. Seite 147.

Trogon Curucui. LINN. *Onom. hist. nat. compl.* VII. pag. 591.

TROGONUM GENUS.

Trogon Curucui. Der schwarzkehlige Baumhacker. BOROWSKI *Naturgesch. II. Seite 123. Taf. 76.* (fig. Marcgrauii ex arbitrio pictoris colorata.)

In Insula Dominicensi: Le Caleçon rouge; *in reliquis Insulis Dame angloise dicitur teste Buffon.*

β. *Huius an varietas, an pullus, an foemina?*

Auis MARCGR. *Hist. Bras.* pag. 219.

Auis, quam auctor non nominat, sed tantum admonet esse speciem Curucui. JONST. av. pag. 224.

γ? Tzinitzcan. FERNAND. av. *Nov. Hisp.* cap. 43. pag. 23.

Tzinitzian. WILLUGHB. *Orn.* pag. 303.

RAII. *syn. av.* pag. 163.

JONST. *av.* pag. 184.

strigilatus 3. TROGON cauda longa, rectricibus sex intermediis aequalibus; 3, 3 paulo breuioribus.

Le Couroucou cendré de Cayenne - Trogon saturate cinereus; ventre flavo aurantio, rectricibus alarum superioribus nigricantibus, lineolis albis transversim striatis; rectricibus nigricantibus, tribus vtrinque extimis exterius albo transversim striatis, apice albis - Trogon Cayanensis cinereus. BRISS. *Orn. IV.* pag. 165. tab. 16. fig. 1.

Curucu cenerino di Cayenna. Trogon Cayanensis cinereus Briss. GERINI. *Orn. II.* p. 53. tab. 188. (malá.)

Trogon (*strigilatus*) cinereus, alis strigis albis. LINN. *Syst. nat. ed. 12. I.* pag. 167.

Gestreifter Baumhacker. MÜLL. *Linn. Nat. Syst. II.* Seite 202.

Trogon strigilatus. *Onom. hist. nat. compl. VII.* pag. 592.

Couroucou de la Guyane. *Pl. entl. No. 765.*

BUFF. *hist. des Ois. VI.* p. 292.

Fasciated Couroucou. INDIAN. *Zoology.* Tab. 5. (secundum PENN. *gen. of birds.*)

+ *ferrugineus* 4. TROGON alis breibus, pedibus semilanatis.

Trogon Ceylonensis Briss. Couroucou de Ceylon Gallis. Der Ceylonische Baumhacker. *Onomat. hist. nat. compl. VII.* pag. 591.

Couroucou

Couroucou à queue rousse de Cayenne. *Pl. ent. No. 736.*

BUFF. *hist. des Ois. VI.* pag. 295.

\dagger *flammeus* 5. TROGON alis breibus, pedibus totis lanatis.

Pithecias flammeus viridis et cinereus, rostro ferrato. FEUILLÉE *Suite du Journ. des Observ.* pag. 20.

Green yellow-bellied Cuckow. EDW. *Glean. Tab. 331.*

Trogon (*Curucui*) viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra. LINN. *Syst. nat. ed. 12. I.* pag. 167. (exceptis synonymis plerisque.)

Schwarzkehle. Trogon *Curucui*. MÜLL. *Linn. Nat. Syst. II.* Seite 203.

viridis 6. TROGON cauda longa, rectricibus sex intermediis aequalibus; 3, 3 multo breuioribus.

Trogon (*viridis*) viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra. LINN. *Syst. nat. ed. 12. I.* pag. 167.

Der grüne Baumhacker. Trogon *viridis*. MÜLL. *Linn. Nat. Syst. II.* Seite 203.

Trogon *viridis*. Der grüne Baumhacker. BOROWSKI *Nat. Gesch. II.* Seite 123.

Trogon *viridis*. *Onomat. hist. nat. compl. VII.* pag. 593.

Maris synonyma.

Lanius capite, collo, pectoreque e violaceo nigrantibus, digitis duobus anticis toti- demque posticis. KÖLREUTER. *Nov. Comment. Petrop. XI.* pag. 436. *Tab. 16. fig. 8.*

Le Couroucou verd de Cayenne. Trogon superne viridi aureus, inferne flavo- aurantius; capite superiore et collo caeruleo-violaceis; viridi-aureo colore va- riantibus, genis et gutture nigris; taenia transuersa in pectore viridi-aurea; rectricibus nigrantibus, quatuor intermediis viridi-aureo mixtis vtrinque sequenti exterius viridi-aurea, tribus vtrinque extimis apice oblique et denta- tim albis. Trogon *Cayanensis viridis*. BRISS. *Orn. IV.* pag. 168. *Tab. 17. fig. I.*

Curucu di Cayenna verde. Trogon *Cayanensis viridis* Briss. GERINI *Orn. II.* pag. 53. *Tab. 189.* (mala.)

BUC'HOZ. *Abbild. der Vögel. Tab. 26.* (mala.)

Couroucou

TROGONUM GENUS.

Couroucou de Cayenne. *Pl. ent. No. 195.*

Le Couroucou à ventre jaune. *BUFF. Hist. des Ois. VI. pag. 291.*

Le Couroucou à chaperon violet. *IDEM ibid. pag. 294.*

Fœminæ synonyma.

Le Couroucou verd à ventre blanc de Cayenne. — *Trogon superne viridi-aureus, inferne albus; capite superiore et collo caeruleo-violaceis, viridi-aureo colore variantibus; genis et gutture nigris; taenia transuersa in pectore viridi-aurea; rectricibus nigris, binis intermediis viridi-aureo mixtis, duabus vtrinque sequentibus exterius viridi-aureis, tribus vtrinque extimis apice oblique albis.* *Trogon Cayanensis viridis ventre candido. BRISS. Orn. IV. pag. 170.*

Curucu di Cayenna verde nel dorso e nelle altre parte superiori, e bianco nella pancia. Trogon Cayanensis viridis ventre candido Briss. GERINI Orn. II. pag. 53.

Couroucou vert à ventre blanc de Cayenne. *BUFF. Hist. des Ois. VI. pag. 293.*

Un autre individu. *IDEM. ibid. pag. 294.*

Quae hic *tabula nona* exhibetur *Trogonis Curucui* icon ab *Eberleinio* magnitudine naturali secundum exemplar in Collectione Dolmeriana confecta, adeo naturae refert similitudinem, vt non facile descriptionis defectum sentias, a qua conficienda eo tempore impeditus fui.

Frin-



B. Mervoni pinx.

Drossel Finke.
Fringilla iliaca.

Branch.



+ Fringilla Iliaca.

Noua haec est Fringillae species, ab Armigero Hassico ex America septentrionali aduecta, inque meum translata Museum, cuius solam hic exhibeo descriptionem, qui de patria, moribus, vitaeque ratione ac viatu illius adferre alia plura haud aequē possim.

D E S C R I P T I O F R I N G I L L A E I L I A C A E.

Tabula Decima.

Magnitudo Sturni.

Roftrum conicum, acuminatum, flauum, pagina superiore et apice nigrum.

Nares minimae, ouatae, sub fronte fere latentes.

Caput paruum.

Collum breue.

Corpus pennis magnis mollibus amplisque teclum, plumis indutum nullis.

Alae breues, conflatae ex *Remigibus* sedecim, quarum prima breuissima, secunda huic multo longior, tertia paullo longior secundae omnium longissima est: inde ad decimam vsque, excepta decima-sexta, omnium breuissimam, sensim decrescunt; a qua iterum ad decimam vsque quintam longitudine augentur. Priores quinque acuminatae sunt, angustamque habent barbam exteriorem, a basi tamen ultra medianam pennae longitudinem, in 2, 3, 4, 5 amplificatam: Sextae quoque, 7, 8, 9 et 10 barba exterior adhuc quodammodo valde angusta, earumque remigum apex oblique truncatus est; 11, 12, 13 fere truncatae sunt; 14, 15, 16 autem rotundatae, et ex iis priores binae aequalis longitudinis barba infrauctae sunt. *Ala notha* pennis constat tribus acuminatis. *Superiores* alarum *tectrices* primi ordinis duriusculae sunt, atque acutae, secundi ordinis magnae ac rotundae, tertii ordinis paruae et rotundae; eiusdemque indolis marginales *tectrices inferiores*; reliquae molliissimae, amplissimae, longissimae.

Merrem av. ic. II.

F

Pedes

Pedes magni, scutis vix dignoscendis antice obtecti, caeterum fere glabri. *Digiti* breves, fortesque, eorumque medius longissimus, laterales paulo breuiores, posticus omnium brevissimus, ast vnguicula longissima fortissimaque praeditus. *Vnguiculae* longae acuminatae, subincuruae, imbecilles. *Pedes*, *digiti* et *vngues* flauescunt.


Cauda aequalis, Re|et
ricibus constans duodecim, mollibus, rotundato-acuminatis.

Color pennarum superiorem corporis partem tegentium basi cinereus, medio oliueus, apice fuscus. *Uropygium* et *Cauda rufa*; *Re|et
| |
ricum* autem externa quaeque reliquis dilutior, barba vero latior *Re|et
| |
ricum* 2, 3, 4, 5 prope scapum ad cinereum tendit colorem. *Cauda* subitus dilute grisea. *Remiges fuscae*, margine exteriore rufae, ultimarum apicibus albidis. *Alarium tactrices* ex rufo-fuscecent. Inferiores corporis partes et genae albae sunt, apicibus pennarum gutturalium et hypochondriacarum bruneis, in vtroque corporis latere lineam bruneam formantibus. In pectore insuper sparsae sunt maculae griseo-fuscae triangulares, in ventre lineolae fuscae. Inferiores alae tactrices canae sunt, marginibus apicibusque albis.

M E N S U R A E.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|-----|
| Longitudo ab apice rostrum ad caudam extremam | - | - | - | 6" | 8" | 5" |
| Longitudo rostrum ad frontem | - | - | - | - | 0, | 5, |
| Longitudo alae complicatae | - | - | - | - | 3, | 2, |
| Longitudo pedis | - | - | - | - | 0, | 11, |
| Longitudo digiti medii (Vnguis 4" 1") | - | - | - | - | 1, | 0, |
| Longitudo digiti externi (Vnguis 3, 5) | - | - | - | - | 0, | 10, |
| Longitudo digiti interni (Vnguis 3, 5) | - | - | - | - | 0, | 9, |
| Longitudo digiti postici (Vnguis 4, 5) | - | - | - | - | 0, | 7, |
| Longitudo caudae | - | - | - | - | 2, | 5, |

Pene-



Berkenhamp del.

Grünglänzender Yaku.
Penelope Jacupema.

Finsch ex.

+Penelope Iacupema.*

Quamquam more suo nimis variis iustoque lucidioribus colorum pigmentis EDWARDUS auem illam, quam Quan nomine a conterraneis appellari refert, representauerit, facile tamen appareat, hanc iuxta cum illa, quam in GERINIANO Opere, quamlibet maiori adhuc colorum varietate insignem, diuersoque corporis habitu pictam, ab EDWARDO tamen certe transsumtam mutuatamque, vel ipsa fidem eius rei faciente descriptione EDWARDA, agnoscas, eandem cum nostra auem referre; cuius exuuiarum visendarum copia mihi facta est in Museo Viri Amplissimi Consultissimique, F. W. ICKEN, Reipublicae Bremanae Senatoris grauissimi. Iure etiam meritoque

F 2

ad

* Iacupema Brasiliensibus. MARCGR. Hist. Bras. pag. 198. (cum figura pessima.)

- Iacu - Pema. PISON. Ind. pag. 81. cum figura Marcgrauii.

Iacoupen? LERIVS DE BRY Amer. III. pag. 185.

Iacupema Brasiliensium Marcgrauii. WILLUGHE. Orn. pag. 118. tab. 28. cum figura Marcgrauii.

Phasianus Brasiliensis Iacu - pema dictus Marcgrauii. RAI Syn. Av. p. 56. (male coniuncta hac aue cum Cozolitli Fernandezii, qua in re Kleinius Rauum secutus est.)

Iacupema Brasiliensibus. IONSTON Av. pag. 204. tab. 58. fig. Marcgr.

The Guan or Quan. EDW. birds. I. pag. 13. tab. 13.

Der brasiliische Fasan, Phasianus brasiliensis. SELIGM. Ausl. Vög. I. Taf. 25. figura Edwardi.

Alektor brasilianus. KLEIN Hist. av. pag. 112.

Phasianus fuscus brasiliensis. KLEIN. l. c. pag. 114.

Brasiliander. KLEIN Hist. d. Vög. Seite 114.

Brauner Brasiliander. KLEIN a. a. O. Seite 118.

Das schwarze geschuppte Huhn. HALLENS Naturgesch. II. Seite 426.

Der dunkelbraune Fasan. IDEM ibid. pag. 435.

Coq du Brésil. Diction. des anim. I. pag. 699.

Faisan du Brésil. Diction. des anim. II. pag. 150.

Le Dindon du Brésil. Gallo-pauo caruncula in fronte carens. Gallo-pauo brasiliensis. BRISS. Orn. I. pag. 162.

Gallo - Pavone del Brasile. Gallo - Pavo brasiliensis Briff. GERINI. Orn. II. pag. 77. tab. 227.

Guan f. Quan. Onomat. hist. nat. compl. IV. pag. 96.

Meleagris (cristata) capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis. LINN. syst. nat. ed. 12. L. pag. 269.

Der Brasilianische Truthahn. Meleagris cristata. MÜLL. Linn. Nat. Syst. II. Seite 464.

BOROWSKY gemein. Nat. Geschichte. II. Seite 170.

LESKE Nat. Gesch. I. Seite 222.

L' Yacou BUFF. hist. nat. des Ois. II. pag. 387.

Der Yaku. BUFF. allgem. Hist. d. N. Theil 10. Band 2. Seite 74. Taf. 16. cum fig. Edwardi.

Meleagris cristata. Der Jaku. GATTERER vom Nutz. u. Schad. der Thiere II. pag. 243.

A Brasiliensibus ac Guyanenensibus secundum Marcgrauium Iacupema, secundum Edwardum Quan, sive Quan dicitur.

ad eandem cum *Quan EDWARDI* speciem MARCGRAVII *Iacupemam* ab Illustribus naturalis historiae scriptoribus, a BRISSONIO quidem, LINNAEO et Comite A BUFFON relatam esse, collata hac Iacupemae nostrae descriptione cum MARCGRAVIANA non dubitaueris amplius, vtut illa abdomine leucophaeato, haec vero toto nigro praedita fit.

Nostra sane, quam hic exhibemus, avis exemplo est, quam difficile sit, Genera in Gallinarum Ordine recte constitueret. EDWARDUS nempe, LINNAEUS atque BRISSONIUS *Meleagridem* appellant; Ill. Comes A BUFFON inter *Craces* recenset; MARCGRAVIO Phasianus est. Anatome in auxilium vocata mox apparet, *Cracibus* esse inferendam, ingluwiei nempe, ventriculi, intestinorum, asperaeque arteriae structura adeo Craci Aleotori similis est, vt, sublata omni dubitatione, eiusdem cum ea generis censi debeat; non obstante eo, quod cera omnino careat, rostrique figura, externoque corporis habitu quodammodo diuersa fit. Hanc porro *Penelopen Iacupema*, si cum *Leucolopho*, cuius descriptio sequitur, comparaueris, toto corporis habitu illi simillimam deprehenderis, nisi quod huius arteria aspera, vt in plerisque auibus, recta in pectus procedat; cum contra in *P. Iacupema*, perinde vt in *Parraka* prius supra totum sternum extendatur atque reflextatur quam pectus intret *. Vnde concilio, nec ceram, nec asperae arteriae conformatio ad genera distinguenda sufficere. Observavi etiam in diuersis *Cracibus*, haec tenus quidem descriptis, a grandi inde *Cracis Aleotoris* cera ad plane deficientem, inque caeteris congenerum avium speciebus a cutis nudae, sub gutture pendulae, genarumque nudarum, papillofarum, et reliquorum capitis ornamentorum, tam carneorum quam pennaceorum praesentia, ad harum usque rerum defectum, tot vix animaduertendos adesse gradus, qui impedian, quo minus generum characteres certi inde possint depromi; multasque adeo volucrum species, multis modis a systemati conditoribus aut separatas aut coniunctas, tam propinqua cognatione inter se esse connexas, vt omnes ad unum idemque genus, *Alektor* (germanice *Hocko*) nominandum, referenda sint, sitque adeo verisimile, eas, nisi magnitudo impedit, generatione hybrida pullos procreare posse: Quod genus, cum multis fane species comprehendat, in plures phalanges dividendum videtur, quarum primam cum LINNAEO atque BRISSONIO *Cracem*, eam, ad quam nostra pertinet species, *Penelopen*, tertiam, ad quam Phasianus Motmot et similes ei referenda sunt aues, *Ortalida* appello. A Gallopauone Iacupema nostra, omnium internarum externarumque partium figura differt: a Phasianis quoque cum congeneribus separanda restringit numero duodeno, earum figura, defectu calcarium in maribus, partiumque internarum structura.

Exemplar,

* Accuratio rem asperae huius Arteriae descriptionem, eiusque delineationem in generali avium Historia exhibeo.

Exemplar, quod nobis pro descriptione et delineatione inferuit, ex *Guyana*, cuius species haec indigena est, in patriam urbem viuum aduenatum, ibique in auiario cum Gallinis domesticis habitum, feminibus Zeae Maydis nutritum, breui post aduentum tempore mortuum est. De vita genere praesens eius Possessor, qui per binas tantum noctes viuum aluerat, exponere mihi non poterat. Secundum MARCGRAVIUM *Iacu*, *Iacu* clamitare, Caro gustu suavis praedicatur.

D E S C R I P T I O PENELOPES IACUPEMÆ.

Tabula Undecima.

Magnitudo Gallinae domesticæ magnæ; *Habitus* Cracum.

Rostrum gallinaceum, absque cera. *Nares* maximæ, a rostri exortu ad medium usque eius longitudinem porrectæ, basi magna squama obiectæ.

Caput paruum, crista humili, ex pennis longioribus conflata testum. EDWARDUS etiam non cristatas inuenire refert, quas pro foeminis habet. *Genae* nuda, cute nigra, secundum EDWARDUM caerulea, vestitæ. Sub *Guttura* cute itidem nuda, laxa, vibrissis paucis nigris instructa, sanguinea, pet semunciam pendula donatur. *Oculi* grandes.

Collum longum.

Corpus elongatum, teres, pennis magnis vestitum. Pennae dorsales breues sunt atque plumosæ.

Pedes fortes, scutis testi. *Digiti* semipalmati, longiusculi; medius longissimus, laterales multo breviores, posticus omnium minimus. Color in viua aue sanguineus est, in mortuæ exuviis, quibus usus sum, ex fusco-rubescibant. *Vngues* breuissimi erant, acuti atque nigrantes, digitus vero posticus omnino vngue carebat, cuius rei caufa in ornithonis solo lapideo ponenda mihi videtur.

Reffrices quoque in exemplari meo truncatae erant; nescio an fractæ, an abscissæ.

Pennarum color niger, viridem colorem reflectens: sub gutture atque collo, albo instructæ sunt margine. Abdomen totum nigrum, nec, uti MARCGRAVIUS describit, leucophaeatum. Remiges maiores fuscescentes; dorsum bruneum, pennarum apicibus nigris.

M E N S U R A E.

| | I' | II'' | O''' | O'''' |
|---|----|------|------|-------|
| Longitudo totius auis ab apice rostrum ad caudam extremam | - | - | - | - |
| Longitudo rostrum usque ad frontem | - | - | - | - |
| Longitudo rostrum usque ad oris angulum | - | - | - | - |
| Longitudo pedis | - | - | - | - |
| Longitudo digiti medii (Vnguis 2" 8'') | - | - | - | - |
| Longitudo digiti externi (Vnguis 3" 0'') | - | - | - | - |
| Longitudo digiti interni (Vnguis 2, 8) | - | - | - | - |
| Longitudo digiti postici (Vnguis nullus) | - | - | - | - |

Penel-



Borbonkamp del.

Weishaubiger Yaku.
Penelope teucolophos.

Findner sc

Penelope Leucolophos. *

Auis haecce praecedenti, vt facile cuique, vtriusque icones comparanti, apparebit, simillima, nisi quod corpore fit graciliori, asperaque eius arteria recta via pectoris cauum intret, non aequa, vt in priori, super sternum reflexa, eodem cum illa tempore ex Guyana allata, nec ipsa viuacior, ac priusquam praesens eius Possessor mores eius obseruare posset, mortua, in eodem artificiose farinarum Auium museo Grauissimi IKENII afferuatur.

Delineata a me non fuisset, certe hoc loco aeri incisa non exhibita denuo, nisi serius, quam optasse; BAJONIS descriptionem, iconemque accepisse; ea vero, quam eius imaginem coloribus illustratam expressamque in *Mantissa ornithologica* sua CL. DE LA CQUIN filius edidit, a naturae veritate aberrantem, adiectamque eius descriptionem ita comparatam animaduertissim, quae magis secundum figuram, parum curatam, quam inspeclis praesentibus auis exuviis confecta videatur. Forte deceptus Vir ille Clarissimus similitudine auis nostrae cum reliquis Cracibus, ceras illi tribuit, quam nullam habet; deinde etiam in eo fallitur, quod albis maculis in pectori notatam referat, vti etiam figura eam exhibit, cum re vera pennae omnes pectorales atrae, marginibus autem albis circumdatae sint: Caudam idem tam male delineatam sifit, vt ne auium quidem caudam referre videatur; etiamsi enim, in eo, quo usus sum, exemplari, haec ipsa mutila conspicetur, hoc tamen conicere licebat, longam fuisse eam, atque pendulam, quae mea conjectura etiam BAJONIS descriptione confirmatur; non autem, vt IAQVINUS exhibit, breuem, rectamque. Non minus naturae aduersatur character et descriptio, quae remiges primas albas praedicant, re vera nigras, teclericibus autem albis, scapo nigro instrutis, praeditas.

Habitat rarius in propinquis Cayennae regionibus, totius Guianae tractuumque confinium incola inter flumina Orenoko, atque Oigapok, in primis in inferioribus terrae prope Amazonum flumen. Vox imbecilla atque duplex, altera Gallopauonum iuniorum similis, ab aue saepe editur, et a barbaris sono Cujovit assimilatur, alteram ab animalibus tantum persecuta, aut morbo,

fameque

* Iacoutin? LERIVS DE BRV Amer. III. pag.

185.

L'Yacou. BAJON Mem. pour servir à l'Hist. de Cayenne. I. pag. 398. Tab. 5.

Der Orenoko Pauwls. Crax (cumanensis) cera

nigra, corpore nigro, crista remigibusque primis albis. IACQUIN Beytr. zur Gesch. d. Vog. Seite 25. Taf. 10.

In Brasilia Yaku, in Guyana Kujowit auctore Bajon dicitur.

fameque laborans edit, Yaku sono similem *Maraye* maribus vitaeque genere simillimam refert **B A J O N**, eodem ac illa modo caudam tollere et rotare, per minora tantum spatia volitare, nidiunque in arboribus trunco proximum ftruere, oua quatuor sexue ponere pullos a matre tantum, donec pennae creuerunt, nutriri, inde in terram descendere, granisque, fructibus, vermbus et insectis, a matre terra ruspandis vesci, ac facile mansuescere narrat.

D E S C R I P T I O P E N E L O P E S L E U C O L O P H I .

Tabula duodecima.

Penelope Iacupema minor, atque gracilior.

Rostrum minus, magisque depresso, quam in congeneribus, ex nigro corneum. *Nares* ampliae, fere totae squama testae. *Cera* nulla.

Caput paruum. *Genae* nudae, atrae; ex *B A J O N I S* descriptione coerulescentes, vt in *Gallo-pauone Meleagridae LIN. iuniore*. *Pileus* usque ad nucham cristatus pennis longis angustis.

Oculi ex Consultissimi Doct. Senat. IKEN descriptione tantae erant pulchritudinis, vt pulchriores ullos se unquam in aue quadam vidisse, negaret. Grandes erant, scribit in literis ad me datis, prominentes, atque ex obscurro claram referebant lucem, Adamantis splendori similem, proque vario corporis situ eiusdem interdum videbantur coloris: Scio equidem, addit, magnam me, multique momenti moliri comparationem, sed hoc fane scio, omni, quacum comparari potuissent, re pulchriores fuissent, omnique comparatione superiores. *B A J O N U S* oculos magnos, prominentes, et pallide rosea iride praeditos esse dicit.

Gula cute nuda, minus tamen, quam in praecedenti pendula, nigra, pennis rariss, pilorum aemulis, hinc illinc testa vestitur.


Collum longum.


Corpus gracile, pennis magnis rotundis vestitum.

Alae ultra caudae exortum protensa, remigibus conflant duris, rotundatis, quarum binae priores supra medium longitudinis partem angustantur, et falciformes existunt.*

Crura

* Altera harum remigum, Brema iamiam a me relicta, in inferiore tabulae-duodecimae parte depicta, nimis recta delineata est.





SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00865 7967